ANEXO I

RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO MEDICAMENTO

1. NOME DO MEDICAMENTO VETERINÁRIO

Eurican DAPPi-LR liofilizado e suspensão para suspensão injetável

2. COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA

Uma dose de vacina liofilizada, contém:

Substâncias ativas:

Vírus da esgana atenuado, estirpe BA 5	$\geq 10^{4.0}$ DICC ₅₀ (*)
Adenovírus canino tipo 2 atenuado, DK13	$\geq 10^{2.5}$ DICC ₅₀ (*)
Parvovírus canino atenuado, estirpe CAG2	$\geq 10^{4.9}$ DICC ₅₀ (*)
Vírus canino parainfluenza tipo 2 atenuado, estirpe CGF 2004/75	$\geq 10^{4.7}$ DICC ₅₀ (*)

(*DICC₅₀:Dose infecciosa em cultura celular 50%).

Uma dose de suspensão, contém:

Substâncias ativas:

Leptospira interrogans serovar *canicola* inativada, estirpe 16070 Atividade de acordo com a Farm Eur.447*

Leptospira interrogans serovar *icterohaemorrhagiae* inativada, estirpe 16069..... Atividade de acordo com a Farm Eur 447*

Vírus da raiva inativado, estirpe G52 ≥ 1 UI.

*80% de proteção em “hamsters”.

Adjuvante:

Hidróxido de alumínio 0,6 mg.

Excipiente:

Para a lista completa de excipientes, ver secção 6.1.

3. FORMA FARMACÊUTICA

Liofilizado e suspensão para suspensão injetável.

Liofilizado bege a amarelo pálido e suspensão opalescente e homogénea.

4. INFORMAÇÕES CLÍNICAS

4.1 Espécie(s)-alvo

Cães.

4.2 Indicações de utilização, especificando as espécies-alvo

Imunização ativa de cães, para:

- prevenir a mortalidade e os sinais clínicos causados pelo vírus da esgana (CDV),
- prevenir a mortalidade e os sinais clínicos ligados à hepatite contagiosa canina, causada pelo vírus da hepatite (CAV);
- reduzir os sinais clínicos e a excreção viral durante a doença respiratória causada pelo adenovírus canino tipo 2 (CAV 2);
- prevenir a mortalidade, os sinais clínicos e a excreção viral ligados ao parvovírus canino (CPV)*;
- reduzir os sinais clínicos e a excreção viral ligados ao vírus canino parainfluenza tipo 2 (CPiV)**;
- reduzir a mortalidade, os sinais clínicos e a excreção bacteriana ligados à *Leptospira interrogans* serovar *canicola* e à *Leptospira interrogans* serovar *icterohaemorrhagiae*;
- prevenir a raiva.

Início da imunidade: 2 semanas para todas as estirpes.

Duração da imunidade: pelo menos 1 ano após a segunda injeção da primovacinação para todas as estirpes.

O desafio atualmente disponível e dados sorológicos mostram que a proteção contra o vírus da cinomose, adenovírus e parvovírus * tem a duração de 2 anos após a primovacinação seguida por um primeiro reforço anual.

Qualquer decisão de adaptar o calendário de vacinação deste medicamento veterinário, deve ser tomada caso a caso, tendo em conta o histórico de vacinação do cão e o contexto epidemiológico.

*A proteção foi demonstrada contra o parvovírus canino tipo 2a, 2b e 2c, pelo menos 1 ano quer por ensaio (tipo 2b) ou serologia (tipo 2a e 2c).

** Para o vírus da parainfluenza canina, a redução de sinais clínicos não pôde ser demonstrada no período de estudo de imunidade porque os cães adultos não expressaram suficientemente sinais clínicos após o desafio.

4.3 Contraindicações

Não existem.

4.4 Advertências especiais para cada espécie-alvo

Não existem.

Vacinar apenas animais saudáveis.

4.5 Precauções especiais de utilização

Precauções especiais para a utilização em animais

Vacinar apenas animais perfeitamente saudáveis e corretamente desparasitados, pelo menos 10 dias antes da vacinação.

Após vacinação as estirpes vacinais CAV 2 e CPV podem-se transmitir a animais não vacinados, sem consequências adversas para estes animais em contacto. Alguns animais vacinados, embora protegidos, podem não apresentar título de anticorpos da raiva de 0,5 IU/ml, requerido quando se viaja para alguns países que não pertencem à UE. Neste caso, o médico veterinário pode ponderar fazer uma vacinação adicional contra a raiva.

Precauções especiais a adotar pela pessoa que administra o medicamento veterinário aos animais

Em caso de autoinjeção acidental, dirija-se imediatamente a um médico e mostre-lhe o folheto informativo ou o rótulo.

4.6 Reações adversas (frequência e gravidade)

Muito raramente:

- Foram observadas reações de hipersensibilidade, incluindo edema facial, choque anafilático e urticária. Nestes casos, deve ser instaurado um tratamento sintomático apropriado.
- Observou-se emese e apatia transitória com duração máxima de um dia.
- Pode ocorrer imediatamente após a injeção um ligeiro prurido e dor no local da injeção.
- Pode ocorrer após a injeção uma ligeira tumefação (≤ 4 cm) no local da injeção, que geralmente passa dentro de 1-4 dias.
- A presença de hidróxido de alumínio pode induzir o aparecimento, no local de injeção, de um nódulo pequeno e transitório.

A frequência dos eventos adversos é definida utilizando a seguinte convenção:

- muito frequente (mais de 1 animal apresentando evento(s) adverso(s) em 10 animais tratados)
- frequente (mais de 1 mas menos de 10 animais em 100 animais tratados)
- pouco frequente (mais de 1 mas menos de 10 animais em 1 000 animais tratados)
- rara (mais de 1 mas menos de 10 animais em 10 000 animais tratados)
- muito rara (menos de 1 animal em 10 000 animais tratados, incluindo notificações isoladas).

4.7 Utilização durante a gestação, a lactação ou a postura de ovos

Pode ser administrado durante a gestação.

4.8 Interações medicamentosas e outras formas de interação

Não existe informação disponível sobre a segurança e a eficácia desta vacina quando utilizada com qualquer outro medicamento veterinário (exceto com a Eurican DAPPi-L). A decisão da administração desta vacina antes ou após a administração de outro medicamento veterinário, deve ser tomada caso a caso e tendo em consideração a especificidade da situação.

4.9 Posologia e via de administração

Injetar 1 dose de 1 ml, por via subcutânea, de acordo com o seguinte esquema de vacinação:

Primovacinação

Uma injeção de Eurican DAPPi-LR a partir das 12 semanas de idade, 3 a 5 semanas antes ou após uma injeção com a vacina Eurican DAPPi-L.

Nos casos em que níveis elevados de anticorpos maternos forem identificados pelo médico veterinário e em que a primovacinação esteja concluída antes de 16 semanas de idade, uma terceira injeção com uma vacina da Boehringer Ingelheim Animal Health contendo os componentes da esgana, parvovirose e adenovírus é recomendado a partir de 16 semanas de idade, pelo menos, 3 semanas após a segunda injeção.

Revacinações:

Administrar uma dose 12 meses após a conclusão do esquema da primovacinação. Os cães devem ser revacinados com uma dose de reforço única numa base anual.

4.10 Sobredosagem (sintomas, procedimentos de emergência, antídotos), (se necessário)

A injeção de uma sobredosagem de vacina pode induzir uma reação local transitória, similar à descrita na secção 4.6. “Reações adversas”, bem como uma ligeira apatia (1 dia) e uma hipertermia transitória.

4.11 Intervalo(s) de segurança

Não aplicável.

5. PROPRIEDADES IMUNOLÓGICAS

Grupo farmacoterapêutico: Imunológicos para cães - Vacinas virais e bacterianas vivas e inativadas.
Código ATCvet: QI07AJ06.

Vacina contra a esgana, adenovirose, parvovirose e infeções respiratórias por vírus parainfluenza tipo 2 (vivo), e leptospirose por *Leptospira canicola* e *Leptospira icterohaemorrhagiae* e raiva, em cães.

Após administração a vacina induz um estado imunitário contra a esgana, adenovirose (CAV 1 e 2), parvovirose e infeções respiratórias por vírus parainfluenza tipo 2, e leptospirose por *Leptospira interrogans* serovar *canicola* e *Leptospira interrogans* serovar *icterohaemorrhagiae* e raiva, demonstrado por contraprova e pela presença de anticorpos.

6. INFORMAÇÕES FARMACÊUTICAS

6.1 Lista de excipientes

Hidróxido de alumínio.Meio GMEM.
Hidrolisado de caseína.
Fosfato de triptose.
Ácido clorídrico.
Sacarose.
Dextrano.
Sorbitol.
Hidrolisado de colagénio.
Fosfato monopotássico.
Fosfato dipotássico.
Hidróxido de potássio.
Água para injetáveis.

6.2 Incompatibilidades principais

Não misturar com qualquer outro medicamento veterinário, exceto com a suspensão fornecida para utilização com este medicamento veterinário.

6.3 Prazo de validade

Prazo de validade do medicamento veterinário tal como embalado para venda: 2 anos.

Prazo de validade após reconstituição: utilizar imediatamente.

6.4 Precauções especiais de conservação

Conservar e transportar refrigerado (2°C - 8°C).

Proteger da luz.

6.5 Natureza e composição do acondicionamento primário

Acondicionamento primário: frasco de vidro tipo I com elastómero de butilo, fechado com cápsula de alumínio.

Caixa de plástico com 10 frascos de 1 dose de liofilizado e 10 frascos de 1 ml de suspensão.

Caixa de plástico com 50 frascos de 1 dose de liofilizado e 50 frascos de 1 ml de suspensão.

É possível que não sejam comercializadas todas as apresentações.

6.6 Precauções especiais para a eliminação de medicamentos veterinários não utilizados ou de desperdícios derivados da utilização desses medicamentos

O medicamento veterinário não utilizado ou os seus desperdícios devem ser eliminados de acordo com os requisitos nacionais.

7. TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO

Boehringer Ingelheim Animal Health, Unipessoal, Lda.

Av. de Pádua, nº 11

1800-294 Lisboa

8. NÚMERO(S) DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO

870/01/13RIVPT.

9. DATA DA PRIMEIRA AUTORIZAÇÃO/RENOVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO

Data da primeira autorização: 05-11-2013.

Data da última renovação: 10-10-2018.

10. DATA DA REVISÃO DO TEXTO

Maio de 2020.

PROIBIÇÃO DE VENDA, FORNECIMENTO E/OU UTILIZAÇÃO

Não aplicável.

ANEXO III
ROTULAGEM E FOLHETO INFORMATIVO

A. ROTULAGEM

INDICAÇÕES A INCLUIR NO ACONDICIONAMENTO SECUNDÁRIO

10 x 1 dose: 10 frascos de 1 dose de liofilizado e 10 frascos de 1 ml de suspensão
50 x 1 dose: 50 frascos de 1 dose de liofilizado e 50 frascos de 1 ml de suspensão

1. NOME DO MEDICAMENTO VETERINÁRIO

Eurican DAPPi-LR
Liofilizado e suspensão para suspensão injetável.

2. DESCRIÇÃO DAS SUBSTÂNCIAS ATIVAS

Vírus da esgana atenuado, estirpe BA 5 $\geq 10^{4.0}$ DICC50
Adenovírus canino tipo 2 atenuado, DK13 $\geq 10^{2.5}$ DICC50
Parvovírus canino atenuado, estirpe CAG2 $\geq 10^{4.9}$ DICC50
Vírus canino parainfluenza tipo 2 atenuado, estirpe CGF 2004/75 $\geq 10^{4.7}$ DICC50
Leptospira interrogans serovar *canicola* e *icterohaemorrhagiae* inativada: Atividade de acordo com a Farm Eur.447*
Vírus da raiva inativado, estirpe G52 ≥ 1 UI
Hidróxido de alumínio 0,6 mg.

*80% de proteção em “hamsters”

3. FORMA FARMACÊUTICA

Liofilizado e suspensão para suspensão injetável.

4. DIMENSÃO DA EMBALAGEM

10 doses: 10 x 1 dose de liofilizado e 10 x 1 ml de suspensão.
50 doses: 50 x 1 dose de liofilizado e 50 x 1 ml de suspensão.

5. ESPÉCIES-ALVO

Cães.

6. INDICAÇÃO (INDICAÇÕES)

7. MODO E VIA(S) DE ADMINISTRAÇÃO

Via subcutânea.

8. INTERVALO(S) DE SEGURANÇA

Não aplicável.

9. ADVERTÊNCIA(S) ESPECIAL (ESPECIAIS), SE NECESSÁRIO

Antes de administrar, ler o folheto informativo.

10. PRAZO DE VALIDADE

EXP.

Após reconstituição: usar imediatamente.

11. CONDIÇÕES ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO

Conservar e transportar refrigerado.

Proteger da luz.

12. PRECAUÇÕES ESPECIAIS DE ELIMINAÇÃO DO MEDICAMENTO NÃO UTILIZADO OU DOS SEUS RESÍDUOS, SE FOR CASO DISSO

Eliminar os desperdícios de acordo com os requisitos nacionais.

13. MENÇÃO “USO VETERINÁRIO” E CONDIÇÕES OU RESTRIÇÕES RELATIVAS AO FORNECIMENTO E À UTILIZAÇÃO, SE FOR CASO DISSO

Uso veterinário.

Medicamento veterinário sujeito a receita médico-veterinária.

14. MENÇÃO “MANTER FORA DA VISTA E DO ALCANCE DAS CRIANÇAS”

Manter fora da vista e do alcance das crianças.

15. NOME E ENDEREÇO DO TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO

Boehringer Ingelheim Animal Health, Unipessoal, Lda.

Av. de Pádua, nº 11

1800-294 Lisboa

16. NÚMERO DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO

870/01/13RIVPT

17. NÚMERO DO LOTE DE FABRICO

Lote

INDICAÇÕES A INCLUIR NO ACONDICIONAMENTO PRIMÁRIO

Liofilizado: 1 dose

1. NOME DO MEDICAMENTO VETERINÁRIO

Eurican DAPPi-LR

2. COMPOSIÇÃO DA(S) SUBSTÂNCIA(S) ATIVA(S)

DAPPi

3. CONTEÚDO EM PESO, VOLUME OU NÚMERO DE DOSES

1 dose

4. VIA(S) DE ADMINISTRAÇÃO

SC

5. INTERVALO DE SEGURANÇA

6. NÚMERO DO LOTE

Lot

7. PRAZO DE VALIDADE

EXP.

8. MENÇÃO “USO VETERINÁRIO”

Uso veterinário

INDICAÇÕES A INCLUIR NO ACONDICIONAMENTO PRIMÁRIO

Suspensão: 1 ml

1. NOME DO MEDICAMENTO VETERINÁRIO

Eurican DAPPi-LR

2. COMPOSIÇÃO DA(S) SUBSTÂNCIA(S) ATIVA(S)

LR

3. CONTEÚDO EM PESO, VOLUME OU NÚMERO DE DOSES

1 ml

4. VIA(S) DE ADMINISTRAÇÃO

SC

5. NÚMERO DO LOTE

6. NÚMERO DO LOTE

Lot

7. PRAZO DE VALIDADE

EXP.

8. MENÇÃO “USO VETERINÁRIO”

Uso veterinário.

B. FOLHETO INFORMATIVO

FOLHETO INFORMATIVO:

Eurican DAPPi-LR
Liofilizado e suspensão para suspensão injetável.

1. NOME E ENDEREÇO DO TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO E DO TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE FABRICO RESPONSÁVEL PELA LIBERTAÇÃO DO LOTE, SE FOREM DIFERENTES

Titular da autorização de introdução no mercado:
Boehringer Ingelheim Animal Health, Unipessoal, Lda.
Av. de Pádua, nº 11
1800-294 Lisboa

Fabricante responsável pela libertação dos lotes:
Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS
Laboratoire Porte des Alpes,
Rue de l'Aviation,
69800 Saint Priest,
France

2. NOME DO MEDICAMENTO VETERINÁRIO

Eurican DAPPi-LR
Liofilizado e suspensão para suspensão injetável.

3. DESCRIÇÃO DA(S) SUBSTÂNCIA(S) ATIVA(S) E OUTRA(S) SUBSTÂNCIA(S)

Uma dose de vacina liofilizada, contém:

Vírus da esgana atenuado, estirpe BA 5 $\geq 10^{4.0}$ DICC₅₀ (*)
Adenovírus canino tipo 2 atenuado, DK13 $\geq 10^{2.5}$ DICC₅₀ (*)
Parvovírus canino atenuado, estirpe CAG2 $\geq 10^{4.9}$ DICC₅₀ (*)
Vírus canino parainfluenza tipo 2 atenuado, estirpe CGF 2004/75 $\geq 10^{4.7}$ DICC₅₀ (*)

(*DICC₅₀:Dose infecciosa em cultura celular 50%).

Uma dose de suspensão, contém:

Leptospira interrogans serovar *canicola* inativada, estirpe 16070 Atividade de acordo com a Farm Eur.447*

Leptospira interrogans serovar *icterohaemorrhagiae* inativada,
estirpe 16069 Atividade de acordo com a Farm Eur 447

Vírus da raiva inativado, estirpe G52 ≥ 1 UI

Hidróxido de alumínio 0,6 mg.

*80% de proteção em “hamsters”.

Liofilizado bege a amarelo pálido e suspensão opalescente e homogénea.

4. INDICAÇÃO (INDICAÇÕES)

Imunização ativa dos cães, para:

- prevenir a mortalidade e os sinais clínicos causados pelo vírus da esgana (CDV),
- prevenir a mortalidade e os sinais clínicos ligados à ao vírus da hepatite contagiosa canina (CAV),
- reduzir os sinais clínicos e a excreção viral durante a doença respiratória causada pelo adenovírus canino tipo 2 (CAV-2),
- prevenir a mortalidade, os sinais clínicos e a excreção viral ligados ao parvovírus canino (CPV)*,
- reduzir os sinais clínicos e a excreção viral ligados ao vírus canino parainfluenza tipo 2 (CPiV)**,
- reduzir a mortalidade, os sinais clínicos e a excreção bacteriana ligados à *Leptospira interrogans* serovar *canicola* e à *Leptospira interrogans* serovar *icterohaemorrhagiae*,
- prevenir a raiva.

Início da imunidade: 2 semanas para todas as estirpes.

Duração da imunidade: pelo menos 1 ano após a segunda injeção da primovacinação para todas as estirpes.

O desafio atualmente disponível e dados sorológicos mostram que a proteção contra o vírus da cinomose, adenovírus e parvovírus * tem a duração de 2 anos após a primovacinação seguida por um primeiro reforço anual.

Qualquer decisão de adaptar o calendário de vacinação deste medicamento veterinário deve ser tomada caso a caso, tendo em conta o histórico de vacinação do cão e o contexto epidemiológico.

*A proteção foi demonstrada contra o parvovírus canino tipo 2a, 2b e 2c, pelo menos 1 ano quer por ensaio (tipo 2b) ou serologia (tipo 2a e 2c).

** Para o vírus da parainfluenza canina, a redução de sinais clínicos não pôde ser demonstrada no período de estudo de imunidade porque os cães adultos não expressaram suficientemente sinais clínicos após o desafio.

5. CONTRAINDICAÇÕES

Não existem.

6. REAÇÕES ADVERSAS

Muito raramente:

- Foram observadas reações de hipersensibilidade, incluindo edema facial, choque anafilático e urticária. Nestes casos, deve ser instaurado um tratamento sintomático apropriado.
- Observou-se emese e apatia transitória com duração máxima de um dia.
- Pode ocorrer imediatamente após a injeção um ligeiro prurido e dor no local da injeção.
- Pode ocorrer após a injeção uma ligeira tumefação (≤ 4 cm) no local da injeção, que geralmente passa dentro de 1- 4 dias.
- A presença de hidróxido de alumínio pode induzir o aparecimento, no local de injeção, de um nódulo pequeno e transitório.

A frequência dos eventos adversos é definida utilizando a seguinte convenção:

- muito frequente (mais de 1 animal apresentando evento(s) adverso(s) em 10 animais tratados)
- frequente (mais de 1 mas menos de 10 animais em 100 animais tratados)
- pouco frequentes (mais de 1 mas menos de 10 animais em 1 000 animais tratados)
- rara (mais de 1 mas menos de 10 animais em 10 000 animais tratados)
- muito rara (menos de 1 animal em 10 000 animais tratados, incluindo notificações isoladas).

Caso detete quaisquer efeitos mencionados neste folheto ou outros efeitos mesmo que não mencionados, ou pense que o medicamento veterinário não foi eficaz, informe o seu médico veterinário.

7. ESPÉCIES-ALVO

Cães.

8. DOSAGEM EM FUNÇÃO DA ESPÉCIE, VIA(S) E MODO DE ADMINISTRAÇÃO

Injetar 1 dose de 1 ml, por via subcutânea, de acordo com o seguinte esquema de vacinação:

Primovacinação

Uma injeção de Eurican DAPPi-LR a partir das 12 semanas de idade, 3 a 5 semanas antes ou após uma injeção com a vacina Eurican DAPPi-L.

Nos casos em que níveis elevados de anticorpos maternos forem identificados pelo médico veterinário e em que a primovacinação esteja concluída antes de 16 semanas de idade, uma terceira injeção com uma vacina da Boehringer Ingelheim Animal Health contendo os componentes da esgana, parvovirose e adenovírus é recomendado a partir de 16 semanas de idade, pelo menos, 3 semanas após a segunda injeção.

Revacinações:

Administrada uma dose 12 meses após a conclusão do esquema de primovacinação. Os cães devem ser revacinados com uma dose de reforço única numa base anual.

9. INSTRUÇÕES COM VISTA A UMA UTILIZAÇÃO CORRETA

Aplicar os procedimentos usuais de assepsia.

Utilizar material estéril e isento de qualquer vestígio de antisséptico e/ou de desinfetante.

10. INTERVALO(S) DE SEGURANÇA

Não aplicável.

11. PRECAUÇÕES ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO

Manter fora da vista e do alcance das crianças.

Conservar e transportar refrigerado (2°C - 8°C).

Proteger da luz.

Utilizar imediatamente após reconstituição.

12. ADVERTÊNCIA(S) ESPECIAL(AIS)

Advertências especiais para cada espécie-alvo:

Não existem.

Vacinar apenas animais saudáveis.

Precauções especiais para a utilização em animais

Aplicar os procedimentos usuais de assepsia.

Vacinar apenas animais perfeitamente saudáveis e corretamente desparasitados, pelo menos 10 dias antes da vacinação.

Após vacinação as estirpes vacinais CAV 2 e CPV podem-se transmitir a animais não vacinados, sem consequências adversas para estes animais em contacto. Alguns animais vacinados, embora protegidos, podem não apresentar título de anticorpos da raiva de 0,5 IU/ml, requerido quando se viaja para alguns países que não pertencem à UE. Neste caso, o médico veterinário pode ponderar fazer uma vacinação adicional contra a raiva.

Precauções especiais a adotar pela pessoa que administra o medicamento veterinário aos animais

Em caso de autoinjeção acidental, dirija-se imediatamente a um médico e mostre-lhe o folheto informativo ou o rótulo.

Gestação

Pode ser administrado durante a gestação.

Interações medicamentosas e outras formas de interação

Não existe informação disponível sobre a segurança e a eficácia desta vacina quando utilizada com qualquer outro medicamento veterinário (exceto com a Eurican DAPPi-L como recomendado no esquema de primovacinação). A decisão da administração desta vacina antes ou após a administração de outro medicamento veterinário, deve ser tomada caso a caso e tendo em consideração a especificidade da situação.

Sobredosagem (sintomas, procedimentos de emergência, antídotos)

A injeção de uma sobredosagem de vacina pode induzir uma reação local transitória, similar à descrita na secção “Reações adversas”, bem como uma ligeira apatia (1 dia) e uma hipertermia transitória.

Incompatibilidades principais

Não misturar com qualquer outro medicamento veterinário, exceto com a suspensão fornecida para utilização com este medicamento veterinário.

13. PRECAUÇÕES ESPECIAIS DE ELIMINAÇÃO DO MEDICAMENTO NÃO UTILIZADO OU DOS SEUS DESPERDÍCIOS, SE FOR CASO DISSO

O medicamento veterinário não utilizado ou os seus desperdícios devem ser eliminados de acordo com os requisitos nacionais.

14. DATA DA ÚLTIMA APROVAÇÃO DO FOLHETO INFORMATIVO

Maior 2020.

15. OUTRAS INFORMAÇÕES

Caixa de plástico de 10 doses: com 10 frascos (vidro) de 1 dose de liofilizado e 10 frascos (vidro) de 1 ml de suspensão.

Caixa de plástico de 50 doses: com 50 frascos (vidro) de 1 dose de liofilizado e 50 frascos (vidro) de 1 ml de suspensão.

É possível que não sejam comercializadas todas as apresentações.