RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO MEDICAMENTO

1. NOME DO MEDICAMENTO VETERINÁRIO

Deccox 6 - Pré-mistura para alimento medicamentoso para bovinos e ovinos.

2. COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA

Cada 100g contém:

Decoquinato:	600 mg
Òleo de soja estabilizado:	0,285 g
Moagem de trigo:	q.b.p. 100 g

3. FORMA FARMACÊUTICA

Pré-mistura medicamentosa para alimento medicamentoso; pó acinzentado.

4. INFORMAÇÕES CLÍNICAS

4.1 Espécie(s) alvo

Bovinos (Vitelos) e Ovinos (Borregos).

4.2 Indicações terapêuticas

Prevenção e tratamento da coccidiose causada por *Eimeria zuernii*, *E. bovis*, *E. elipsoidallis* nos bovinos, e, *E. arloingi*, *E. ovina*, *E. crandallis*, *E. ahsata*, *E. ovinoidalis* (*ninakohlyakimovae*) e *E. gilruthi* nos ovinos.
Actua sobre as coccidias a nível do intestino delgado, no início do ciclo assexuado, prevenindo o desencadear da doença clínica e inibindo a formação de oocistos.

4.3 Contra-indicações

A administração do medicamento veterinário está contra-indicada em animais gestantes ou com alterações do aparelho respiratório e digestivo, do tipo espástico.

4.4 Precauções especiais de utilização

Não existem.

4.5 Precauções especiais a adoptar pela pessoa que administra o medicamento veterinário aos animais

Evitar contactos cutâneos e a inalação da pré-mistura para alimento medicamentoso ou com o alimento medicamentoso.
Não são conhecidas advertências especiais para as espécies alvo.

4.6 Reacções adversas

Não foram observados efeitos indesejáveis.

4.7 Utilização durante a gestação e lactação

Não administrar a fêmeas gestantes.
Não administrar a fêmeas cujo leite se destine ao consumo humanos.

4.8 Interacções medicamentosas e outras
Não administrar concomitantemente com outros coccidiostáticos

4.9 Posologia, modo e via de administração

Bovinos (Vitelos desmamados) e Ovinos (Borregos desmamados):

TIPO:	PREVENÇÃO	TERAPÊUTICA
Por animal:	0,5 mg/kg p.v.	1 mg/kg p.v.
Na ração:	5 kg/ Tonelada	10 kg/ Tonelada
Período mínimo de Administração:	28 dias	28 dias

4.10 Sobredosagem
Não foi reportada qualquer sintomatologia por sobredosagem.
Bem tolerado em doses 5 vezes superiores à terapêutica, durante 28 dias e, a doses normais, para além deste período.

4.11 Intervalo de segurança
Carne e Tecidos edíveis – 1 dia
Não administrar a fêmeas cujo leite se destine ao consumo humano.

5. PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS

Grupo farmacoterapêutico: Antiprotozoarios
ATCvet code: QP51AX14

5.1 Farmacodinamia
O decoquinato é uma 4-hidroxiquinolona e que actua como coccidiostático, eliminando os sistemas de transporte iónico da mitocôndria da coccidia (esporozoito), não permitindo a sua evolução nas células intestinais do hospedeiro.

5.2 Farmacosinética
É rapidamente eliminado pelo que tem uma reduzida toxicidade, e um elevado factor de segurança (1000).

6. INFORMAÇÕES FARMACÊUTICAS

6.1 Lista excipientes
- Óleo de soja estabilizado
- Moagem de trigo

6.2 Incompatibilidades
Não misturar com outros coccidiostáticos.

6.3 Prazo de validade
Prazo de validade do medicamento veterinário tal como embalado para venda: 3 anos.
Prazo de validade quando incorporado no alimento composto: 2 meses.

6.4 Precauções particulares de conservação
Conservar a temperatura inferior a 25ºC, em local fresco e seco.

6.5 Natureza e conteúdo do recipiente
Sacos de papel revestidos internamente a polietileno contendo 10 kg e 25 kg de pré-mistura para alimento medicamentoso.

6.6 Precauções especiais de eliminação do medicamento não utilizado ou dos seus desperdícios, se existirem
O medicamento não utilizado ou os seus desperdícios devem ser eliminados de acordo com a legislação em vigor.

7. NOME OU DESIGNAÇÃO SOCIAL E DOMICÍLIO OU SEDE DO RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO E DO FABRICANTE

HUVEPHARMA SA
34 rue Jean Monnet
ZI d'Etriché
Segré
49500 Segré-En-Anjou Bleu
França

Destinado exclusivamente às unidades de fabrico de alimentos compostos para animais.

Só pode ser vendido mediante receita médica-veterinária.

Manter fora do alcance e da vista das crianças.

Nº de registo: 51355 no INFARMED
Data da Autorização de Introdução no Mercado: 11 de Fevereiro de 2002
Data da Renovação da Autorização de Introdução no Mercado: 26 de Junho de 2008
Data da revisão de texto: Março 2019

ROTULAGEM
Embalagem de 10 e 25 kg

DECCOX 6

Pré-Mistura para alimento medicamentoso para bovinos e ovinos

1. NOME E ENDEREÇO DO TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO E DO TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE FABRICO, RESPONSÁVEL PELA LIBERTAÇÃO DO LOTE

HUVEPHARMA SA
34 rue Jean Monnet
ZI d'Etriché
Segré
49500 Segré-En-Anjou Bleu
França

2. NOME DO MEDICAMENTO VETERINÁRIO

DECCOX 6 - Pré-Mistura para alimento medicamentoso para bovinos e ovinos

3. DESCRIÇÃO DA(S) SUBSTÂNCIA(S) ACTIVA(S) E OUTRA(S) SUBSTÂNCIA(S)

Cada 100g contém:

Decoquinato	600 mg
Óleo de soja estabilizado	0,285 g

Moagem de Trigo q.b.p. 100 g

4. INDICAÇÃO (INDICAÇÕES)

Prevenção e tratamento da coccidiose causada por *Eimeria zuernii*, *E. bovis*, *E. elipsoidallis* nos bovinos, e, *E. arloingi*, *E. ovina*, *E. crandallis*, *E. ahsata*, *E. ovinoidalis (ninakohlyakimovae)* e *E. gilruthi* nos ovinos.
Ataca sobre as coccidias a nível do intestino delgado, no início do ciclo assexuado, previne o desencadear da doença clínica e inibe a formação de oocistos.

5. CONTRA-INDICAÇÕES

A utilização deste medicamento veterinário está contra-indicada em animais gestantes ou com alterações do aparelho respiratório e digestivo, do tipo espástico.

6. REACÇÕES ADVERSAS

Não foram observadas.

7. ESPÉCIES ALVO

Bovinos (vitelos) e ovinos (borregos).

8. DOSAGEM EM FUNÇÃO DA ESPÉCIE, VIA(S) E MODO DE ADMINISTRAÇÃO

Bovinos (Vitelos desmamados) e Ovinos (Borregos desmamados):

TIPO:	PREVENÇÃO	TERAPÊUTICA
Por animal:	0,5 mg/kg p.v.	1 mg/kg p.v.
Na ração:	5 kg/ Tonelada	10 kg/ Tonelada
Período mínimo de Administração:	28 dias	28 dias

9. INTERVALO DE SEGURANÇA

Carne e vísceras – 1 dia.
Não administrar a fêmeas cujo leite se destina ao consumo humano.

10. PRECAUÇÕES ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO

Conservar a temperaturas inferiores a 25ºC, em local fresco e seco.

11. ADVERTÊNCIA(S) ESPECIAL(AIS)

Precauções especiais a adoptar pela pessoa que administra o medicamento veterinário aos animais
Evitar contactos cutâneos e a inalação da pré-mistura para alimento medicamentoso ou com o alimento medicamentoso.
Não são conhecidas advertências especiais para as espécies alvo.

Utilização durante a gestação e lactação
Não administrar a fêmeas gestantes.
Não administrar a fêmeas cujo leite se destine ao consumo humano.

Interacções medicamentosas e outras
Não administrar concomitantemente com outros coccidiostáticos.

Sobredosagem
Não foi reportada qualquer sintomatologia por sobredosagem.
Bem tolerado em doses 5 vezes superiores à terapêutica, durante 28 dias e, a doses normais, para além deste período.

12. PRECAUÇÕES ESPECIAIS DE ELIMINAÇÃO DO MEDICAMENTO NÃO UTILIZADO OU DOS SEUS RESÍDUOS, SE FOR CASO DISSO

O medicamento não utilizado ou os seus desperdícios devem ser eliminados de acordo com a legislação em vigor.

13. DATA DA ÚLTIMA APROVAÇÃO DO FOLHETO INFORMATIVO

Março 2019

14. OUTRAS INFORMAÇÕES

Prazo de validade:
Válido até:
Prazo de validade quando incorporado no alimento farináceo ou granulado: 2 meses.

15. APRESENTAÇÃO

Sacos de papel, revestidos internamente a polietileno, contendo 10kg e 25kg de pré-mistura para alimento medicamentoso.

Destinada exclusivamente às unidades de fabrico de alimentos compostos para animais.

Só pode ser vendido mediante receita médico - veterinária.

Manter fora do alcance e da vista das crianças

Nº de registo: 51355 no INFARMED

Lote nº:

Válido até:
Prazo de validade após incorporação na ração: 2 meses.

USO VETERINÁRIO
(fundo verde)