ANEXO I

RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO MEDICAMENTO

1. NOME DO MEDICAMENTO VETERINÁRIO

Stabox 1000 mg/g pó para administração na água de bebida para galinhas, patos, perus

2. COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA

1,0 g de pó contém:

Substância ativa:

Tri-hidrato de amoxicilina 1000 mg (equivalente a 871,24 mg de amoxicilina).

3. FORMA FARMACÊUTICA

Pó para administração na água de bebida.
Pó branco ou praticamente branco, cristalino.

4. INFORMAÇÕES CLÍNICAS

4.1 Espécie(s)-alvo

Galinhas, patos, perus.

4.2 Indicações de utilização, especificando as espécies-alvo

Tratamento de infeções em galinhas, perus e patos, causadas por bactérias sensíveis à amoxicilina.

4.3 Contraindicações

Não administrar a coelhos, cricetos (“hamsters”), gerbilos e porquinhos-da-índia.
Não administrar a ruminantes e equinos.
Não usar em casos de hipersensibilidade a penicilinas ou outros antibióticos β -lactâmicos.
Não tratar infeções causadas por bactérias produtoras da enzima betalactamase.

4.4 Advertências especiais para cada espécie-alvo

Não existem.

4.5 Precauções especiais de utilização

Precauções especiais para utilização em animais

Devem ter-se em conta as políticas antimicrobianas oficiais, nacionais e locais quando o medicamento veterinário é usado. A resistência à amoxicilina poderá variar. O uso do medicamento veterinário deve basear-se nos testes de sensibilidade às bactérias isoladas do animal. Se tal não for possível, a terapia deve ser baseada na informação epidemiológica local (regional ou da própria exploração) acerca da suscetibilidade da bactéria alvo.

O uso do medicamento veterinário de maneira diferente das instruções dadas no RCMV pode aumentar a prevalência da bactéria resistente á amoxicilina e diminuir a eficácia do tratamento.

Precauções especiais a adoptar pela pessoa que administra o medicamento veterinário aos animais

Evitar a inalação de poeira e o contacto com a pele.

Ao aplicar ou misturar o medicamento veterinário, deve utilizar ou uma máscara semifacial descartável em conformidade com a Norma Europeia EN 149 ou uma máscara não descartável, em conformidade com a Norma Europeia EN 140 com um filtro EN 143.

Ao aplicar ou misturar o medicamento veterinário, deve utilizar luvas.

As penicilinas podem causar hipersensibilidade (alergia) após a inalação, ingestão e contacto cutâneo. A hipersensibilidade às penicilinas pode conduzir a reações cruzadas com as cefalosporinas e vice-versa. As reações alérgicas a estas substâncias podem, ocasionalmente, ser graves.

Não administrar este medicamento veterinário se souber que tem hipersensibilidade à penicilina ou se o tiverem aconselhado a não trabalhar com tais preparações.

Manusear este medicamento veterinário com grande cuidado para evitar exposições, tomando todas as precauções recomendadas.

Se desenvolver sintomas após a exposição, tais como erupções cutâneas, deverá procurar aconselhamento médico e apresentar este aviso ao médico. Inchaço da face, lábios ou olhos ou dificuldade respiratória são sintomas mais graves e requerem atenção médica urgente.

4.6 Reações adversas (frequência e gravidade)

As penicilinas e cefalosporinas podem causar reações de hipersensibilidade após a administração. Reações alérgicas a estas substâncias poderão, ocasionalmente, ser graves.

A frequência dos eventos adversos é definida utilizando a seguinte convenção:

- Muito frequente (mais de 1 animal apresentando evento(s) adverso(s) em 10 animais tratados);
- Frequente (mais de 1 mas menos de 10 animais em 100 animais tratados);
- Pouco frequente (mais de 1 mas menos de 10 animais em 1 000 animais tratados);
- Rara (mais de 1 mas menos de 10 animais em 10 000 animais tratados);
- Muito rara (menos de 1 animal em 10 000 animais tratados, incluindo notificações isoladas).

4.7 Utilização durante a gestação, a lactação ou a postura de ovos

Estudos de laboratório efetuados com ratos não produziram qualquer prova de efeitos teratogénicos, devido à administração de amoxicilina.

Administrar apenas após análise da relação benefício/risco pelo médico veterinário responsável.

4.8 Interações medicamentosas e outras formas de interação

A amoxicilina exerce o seu efeito bactericida inibindo a síntese da parede das células bacterianas durante a multiplicação.

Em princípio não é compatível com antibióticos bacteriostáticos (ex. tetraciclina, macrólidos e sulfonamidas) que inibem a multiplicação. Sinergismo ocorre com antibióticos β -lactâmicos e aminoglicosídeos.

Não administrar simultaneamente com neomicina, visto que esta bloqueia a absorção das penicilinas orais.

4.9 Posologia e via de administração

Para administração na água de bebida.

A fórmula seguinte poderá ser utilizada para calcular a quantidade de medicamento veterinário necessário por dia (em gramas):

$$\frac{\text{Dose diária em mg de medicamento veterinário por Kg p.c.} \times \text{peso corporal total (kg) de todos os animais tratados}}{\text{consumo total de água de todos os animais tratados (litros)}} = \text{mg do medicamento veterinário / litros de água de bebida}$$

Galinhas:

A dose recomendada é 15 mg de tri-hidrato de amoxicilina por kg de peso corporal.

O período total de tratamento deverá ser de 3 dias consecutivos ou, em casos severos, de 5 dias consecutivos.

Patos:

A dose recomendada é de 20 mg de tri-hidrato de amoxicilina/kg de peso corporal durante 3 dias consecutivos.

Perus:

A dose recomendada é de 15-20 mg de tri-hidrato de amoxicilina por kg de peso corporal durante 3 dias consecutivos ou, em casos severos, durante 5 dias consecutivos.

Para assegurar uma dose correta, deverá determinar-se o peso corporal o mais corretamente possível de forma a evitar subdosagem. A absorção de água medicada depende da condição clínica dos animais. Para obter a dose correta, a concentração de amoxicilina terá de ser adaptada tendo em conta o consumo de água.

Preparar a solução com água da torneira fresca imediatamente antes de administrar.

Qualquer água medicada que não tenha sido utilizada deverá ser eliminada após 24 horas.

Para assegurar o consumo da água medicada, os animais não deverão ter acesso a outras fontes de água durante o tratamento. É recomendada a utilização de equipamento de pesagem adequadamente calibrado para a administração do montante calculado.

A solubilidade na água depende da temperatura e da qualidade da água bem como da duração e intensidade à qual foi agitada. Nas piores condições (10°C e água macia), a solubilidade máxima é de aproximadamente 1,0 g/l mas aumenta à medida que a temperatura aumentar. A partir de 25°C e em caso de água dura, a solubilidade é aumentada até pelo menos 2 g/l.

Para soluções de *stock* e para o uso de um proporcionador: não exceder a solubilidade máxima que pode ser atingida sob as condições dadas. Ajustar as configurações de fluxo da bomba de dosagem de acordo com a concentração da solução de *stock* e com o consumo de água dos animais tratados. O aumento moderado da temperatura e mexer constantemente ajudam a dissolver.

4.10 Sobredosagem (sintomas, procedimentos de emergência, antídotos), se necessário

Não foram observados efeitos secundários após a administração de 5 vezes a dose recomendada. O tratamento deverá ser sintomático e não se encontra disponível nenhum antídoto.

4.11 Intervalo(s) de segurança

Frango (carne e vísceras): 1 dia.
Pato (carne e vísceras): 9 dias.
Peru (carne e vísceras): 5 dias.

Não é autorizada a utilização deste medicamento veterinário em aves produtoras de ovos para consumo humano e nas 3 semanas antes do início do período de postura.

5. PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS

Grupo farmacoterapêutico: antibióticos betalactâmicos.
Penicilinas.
Código ATCvet: QJ01CA04.

5.1 Propriedades farmacodinâmicas

A amoxicilina é um antibiótico bactericida tempo-dependente que pertence ao grupo das penicilinas semissintéticas; atua inibindo a síntese da parede das células bacterianas durante a replicação bacteriana.

A amoxicilina é uma penicilina semissintética com um largo espectro de atividade contra bactérias Gram positivas e Gram negativas e a sua atividade deve-se à inibição do desenvolvimento da estrutura da rede de peptidoglicano da parede celular bacteriana.

Existem 3 mecanismos principais de resistência dos betalactamases: produção de betalactamase; produção de proteínas ligadas à penicilina; e penetração diminuída da membrana exterior. Um dos mais importantes é a inativação da penicilina por enzimas betalactamases produzidas por certas bactérias. Estas enzimas são capazes de partir o anel betalactâmico das penicilinas, tornando-o inativo. As betalactamases podem ser codificadas em genes cromossómicos ou plasmídeos.

Resistência cruzada é observada entre a amoxicilina e outras penicilinas, particularmente com aminopenicilinas.

5.2 Propriedades farmacocinéticas

A amoxicilina é bem absorvida após a administração oral e é estável na presença de ácidos gástricos. A excreção de amoxicilina é efetuada principalmente na sua forma original através dos rins para fornecer uma alta concentração no tecido renal e na urina. A amoxicilina distribui-se bem nos fluidos corporais.

Nas galinhas, a amoxicilina é rapidamente absorvida com T_{max} (=1hr) e concentrações de amoxicilina de < 0,25 µg/ml até 6 horas após uma dose de 10 mg/kg.

Nos perus, com uma dose de 10 mg/kg, a C_{max} é mais baixa do que a das galinhas.

Nos patos, uma dose oral de 20 mg/kg desceu até abaixo do nível de 0,25 µg/ml 5 horas após a administração.

6. INFORMAÇÕES FARMACÊUTICAS

6.1 Lista de excipientes

Nenhum.

6.2 Incompatibilidades

Na ausência de estudos de compatibilidade, este medicamento veterinário não deve ser misturado com outros medicamentos veterinários.

6.3 Prazo de validade

Prazo de validade do medicamento veterinário tal como embalado para venda: 3 anos.

Prazo de validade após a primeira abertura do acondicionamento primário: 3 meses.

Prazo de validade após diluição ou reconstituição de acordo com as instruções: 24 horas.

6.4 Precauções especiais de conservação

Após abertura, não conservar a temperatura superior a 25°C.

Manter o saco bem fechado após a primeira abertura de forma a proteger da humidade e da luz. Qualquer água medicada que não tenha sido consumida dentro de 24 horas deverá ser eliminada.

6.5 Natureza e composição do acondicionamento primário

100 g, 500 g, 1000 g e 5000 g em embalagem de alumínio (PET-ALU-LDPE).

A embalagem de 5000 g é fornecida com ou sem um fecho rápido.

É possível que não sejam comercializadas todas as apresentações.

6.6 Precauções especiais para a eliminação de medicamentos veterinários não utilizados ou de desperdícios derivados da utilização desses medicamentos

O medicamento veterinário não utilizado ou os seus desperdícios devem ser eliminados de acordo com os requisitos nacionais.

7. TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO

VIRBAC

1ère avenue 2065m L.I.D.

06516 Carros

França

8. NÚMERO DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO

708/01/13DFVPT.

9. DATA DA PRIMEIRA AUTORIZAÇÃO/RENOVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO

23 de setembro de 2013 / 14 de agosto de 2018.

10. DATA DA REVISÃO DO TEXTO

Setembro de 2022.

PROIBIÇÃO DE VENDA, FORNECIMENTO E/OU UTILIZAÇÃO

Medicamento veterinário sujeito a receita médico-veterinária.

ANEXO III
ROTULAGEM E FOLHETO INFORMATIVO

A. ROTULAGEM

<INDICAÇÕES A INCLUIR NO <ACONDICIONAMENTO SECUNDÁRIO> <E> <
ACONDICIONAMENTO PRIMÁRIO>

{Saco em alumínio, embalagem primária}

1. NOME DO MEDICAMENTO VETERINÁRIO

Stabox 1000 mg/g pó para administração na água de bebida para galinhas, patos, perus
Tri-hidrato de amoxicilina

2. DESCRIÇÃO DAS SUBSTÂNCIAS ATIVAS E OUTRAS SUBSTÂNCIAS

1.0 g de pó contém:

Substância ativa:

Tri-hidrato de amoxicilina 1000 mg (equivalente a 871,24 mg de amoxicilina)

3. FORMA FARMACÊUTICA

Pó para administração na água de bebida

4. DIMENSÃO DA EMBALAGEM

100 g
500 g
1000 g
5000 g.

5. ESPÉCIES-ALVO

Galinhas, patos, perus

6. INDICAÇÃO (INDICAÇÕES)

Antes de administrar, ler o folheto informativo.

7. MODO E VIA(S) DE ADMINISTRAÇÃO

8. INTERVALO DE SEGURANÇA

Intervalo de segurança:

Galinha (carne e vísceras): 1 dia.

Pato (carne e vísceras): 9 dias.

Peru (carne e vísceras): 5 dias.

Não é autorizada a utilização deste medicamento veterinário em aves produtoras de ovos para consumo humano e nas 3 semanas antes do início do período de postura.

9. ADVERTÊNCIA(S) ESPECIAL (ESPECIAIS), SE NECESSÁRIO

Advertências para o utilizador:

As penicilinas e as cefalosporinas podem, ocasionalmente, causar reações alérgicas graves. Ver o folheto informativo para todos os avisos para o utilizador.

10. PRAZO DE VALIDADE

<VAL {mês/ano}> ou <EXP. {mês/ano}>

Após a primeira abertura / perfuração da embalagem, administrar até:

Prazo de validade após a primeira abertura do acondicionamento primário: 3 meses.

Prazo de validade após diluição ou reconstituição de acordo com as instruções: 24 horas.

11. CONDIÇÕES ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO

Após a abertura, não conservar a temperatura superior a 25°C.

Manter a embalagem bem fechada após a primeira abertura de forma a proteger da luz e humidade.

Qualquer água medicada que não tenha sido consumida dentro de 24 horas, deverá ser eliminada.

12. PRECAUÇÕES ESPECIAIS DE ELIMINAÇÃO DO MEDICAMENTO NÃO UTILIZADO OU DOS SEUS DESPERDÍCIOS, SE FOR CASO DISSO

Eliminação: Ler o folheto informativo.

13. MENÇÃO “EXCLUSIVAMENTE PARA USO VETERINÁRIO” E CONDIÇÕES OU RESTRIÇÕES RELATIVAS AO FORNECIMENTO E À UTILIZAÇÃO, se for caso disso

Uso veterinário

Medicamento veterinário sujeito a receita médico-veterinária.

14. MENÇÃO “MANTER FORA DA VISTA E DO ALCANCE DAS CRIANÇAS”

Manter fora da vista e do alcance das crianças.

15. NOME E ENDEREÇO DO TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO

Titular da autorização de introdução no mercado

VIRBAC

1ère avenue 2065m L.I.D.

06516 Carros

França

Distribuidor

Virbac de Portugal de Portugal Laboratórios
Beloura Office Park
Ed 13- Piso 1, Escr3
Quinta da Beloura
2710-444 Sintra

16. NÚMERO DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO

708/01/13DFVPT

17. NÚMERO DO LOTE DE FABRICO

<Lote><Lot> <BN> {número}

“MVG”

B. FOLHETO INFORMATIVO

FOLHETO INFORMATIVO PARA:

Stabox 1000 mg/g pó para administração na água de bebida para galinhas, patos, perus

1. NOME E ENDEREÇO DO TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO E DO TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE FABRICO RESPONSÁVEL PELA LIBERTAÇÃO DO LOTE, SE FOREM DIFERENTES

Titular da autorização de introdução no mercado

VIRBAC
1ère avenue 2065m L.I.D.
06516 Carros
França

Fabricante responsável pela libertação dos lotes

aniMedica Herstellungs GmbH
Pappelstrasse 7
72160 Horb
Alemanha

2. NOME DO MEDICAMENTO VETERINÁRIO

Stabox 1000 mg/g pó para administração na água de bebida para galinhas, patos, perus
Tri-hidrato de amoxicilina

3. DESCRIÇÃO DA(S) SUBSTÂNCIA(S) ATIVA(S) E OUTRA(S) SUBSTÂNCIA(S)

1 g de pó contém:

Substância ativa:

Tri-hidrato de amoxicilina 1000 mg equivalente a 872,24 mg de amoxicilina

4. INDICAÇÃO (INDICAÇÕES)

Tratamento de infeções em galinhas, perus e patos causadas por bactérias sensíveis à amoxicilina.

5. CONTRAINDICAÇÕES

Não administrar a coelhos, cricetos (“hamsters”), gerbilos e porquinhos-da-índia.

Não administrar a ruminantes e equinos.

Não usar em casos de hipersensibilidade a penicilinas ou outros antibióticos β -lactâmicos.

Não tratar infeções causadas por bactérias produtoras da enzima betalactamase.

6. REAÇÕES ADVERSAS

As penicilinas e as cefalosporinas podem causar reações de hipersensibilidade após a administração. Reações alérgicas a estas substâncias poderão, ocasionalmente, ser graves.

A frequência dos eventos adversos é definida utilizando a seguinte convenção:

- Muito frequente (mais de 1 animal apresentando evento(s) adverso(s) em 10 animais tratados);
- Frequente (mais de 1 mas menos de 10 animais em 100 animais tratados);
- Pouco frequente (mais de 1 mas menos de 10 animais em 1 000 animais tratados);
- Rara (mais de 1 mas menos de 10 animais em 10 000 animais tratados);
- Muito rara (menos de 1 animal em 10 000 animais tratados, incluindo notificações isoladas).

Caso detete efeitos graves ou outros efeitos não mencionados neste folheto, ou se pensa que o medicamento não foi eficaz, informe o seu médico veterinário.

Alternativamente, pode notificar através do Sistema Nacional de Farmacovigilância Veterinária: (SNFV): farmacovigilancia.vet@dgav.pt.

7. ESPÉCIES-ALVO

Galinhas, patos, perus.

8. DOSAGEM EM FUNÇÃO DA ESPÉCIE, VIA(S) E MODO DE ADMINISTRAÇÃO

O medicamento veterinário é administrado na água de bebida.

A fórmula seguinte poderá ser utilizada para calcular a quantidade de medicamento veterinário necessário por dia (em gramas):

$$\frac{\text{Dose diária em mg de medicamento veterinário por Kg} \times \text{peso corporal total (kg) de todos os animais tratados}}{\text{consumo total de água de todos os animais tratados (litros)}} = \text{mg do medicamento veterinário / litros de água de bebida}$$

Galinhas:

A dose recomendada é 15 mg de tri-hidrato de amoxicilina por kg de peso corporal.

O período total de tratamento deverá ser de 3 dias consecutivos ou, em casos severos, de 5 dias consecutivos.

Patos:

A dose recomendada é de 20 mg de tri-hidrato de amoxicilina/kg de peso corporal durante 3 dias consecutivos.

Perus:

A dose recomendada é de 15-20 mg de tri-hidrato de amoxicilina por kg de peso corporal durante 3 dias consecutivos ou, em casos severos, durante 5 dias consecutivos.

Para assegurar uma dose correta, deverá determinar-se o peso corporal o mais corretamente possível de forma a evitar subdosagem. A absorção de água medicada depende da condição clínica dos

animais. Para obter a dose correta, a concentração de amoxicilina terá de ser adaptada tendo em conta o consumo de água.

Preparar a solução com água da torneira fresca imediatamente antes de administrar.
Qualquer água medicada que não tenha sido utilizada deverá ser eliminada após 24 horas.

Para assegurar o consumo da água medicada, os animais não deverão ter acesso a outras fontes de água durante o tratamento. É recomendada a utilização de equipamento de pesagem adequadamente calibrado para a administração da quantidade calculada.

A solubilidade na água depende da temperatura e da qualidade da água bem como da duração e intensidade à qual foi agitada. Nas piores condições (10°C e água macia), a solubilidade máxima é de aproximadamente 1,0 g/l mas aumenta à medida que a temperatura aumentar. A partir de 25°C e em caso de água dura, a solubilidade é aumentada até pelo menos 2 g/l.

Para soluções de *stock* e para o uso de um proporcionador: não exceder a solubilidade máxima que pode ser atingida sob as condições dadas. Ajustar as configurações de fluxo da bomba de dosagem de acordo com a concentração da solução de *stock* e com o consumo de água dos animais tratados. O aumento moderado da temperatura e mexer constantemente ajudam a dissolver.

9. INSTRUÇÕES COM VISTA A UMA UTILIZAÇÃO CORRETA

Não aplicável.

10. INTERVALO DE SEGURANÇA

Galinhas (carne e vísceras): 1 dia.
Patos (carne e vísceras): 9 dias.
Perus (carne e vísceras): 5 dias.

Não é autorizada a utilização deste medicamento veterinário em aves produtoras de ovos para consumo humano e nas 3 semanas antes do início do período de postura.

11. PRECAUÇÕES ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO

Manter fora da vista e do alcance das crianças.

Prazo de validade após diluição ou reconstituição de acordo com as instruções: 24 horas.

Prazo de validade após a primeira abertura do acondicionamento primário: 3 meses.

Após a abertura, conservar a temperatura superior a 25 °C.

Manter o saco bem fechado após a primeira abertura de forma a proteger da luz e humidade.

Qualquer água medicada que não tenha sido consumida dentro de 24 horas, deverá ser eliminada.

Não administrar depois de expirado o prazo de validade indicado no rótulo.

12. ADVERTÊNCIA(S) ESPECIAL(AIS)

Precauções especiais para utilização em animais

Devem ter-se em conta as políticas antimicrobianas oficiais nacionais e locais quando o medicamento veterinário é usado. A resistência à amoxicilina poderá variar. O uso do medicamento veterinário deve basear-se nos testes de sensibilidade às bactérias isoladas do animal. Se tal não for possível, a terapia

deve ser baseada na informação epidemiológica local (regional ou da própria exploração) acerca da suscetibilidade da bactéria alvo.

O uso do medicamento veterinário de maneira diferente das instruções dadas do RCMV pode aumentar a prevalência da bactéria resistente à amoxicilina e diminuir a eficácia do tratamento.

Precauções especiais a adotar pela pessoa que administra o medicamento veterinário aos animais

Evitar a inalação de poeira e o contacto com a pele.

Ao aplicar ou misturar o medicamento veterinário, deve utilizar ou uma máscara semifacial descartável em conformidade com a Norma Europeia EN 149 ou uma máscara não descartável, em conformidade com a Norma Europeia EN 140 com um filtro EN 143.

Ao aplicar ou misturar o medicamento veterinário, deve utilizar luvas.

As penicilinas podem causar hipersensibilidade (alergia) após a inalação, ingestão e contacto cutâneo. A hipersensibilidade às penicilinas pode conduzir a reações cruzadas com as cefalosporinas e vice-versa. As reações alérgicas a estas substâncias podem, ocasionalmente, ser graves.

Não administrar este medicamento veterinário se souber que tem hipersensibilidade à penicilina ou se o tiverem aconselhado a não trabalhar com tais preparações.

Manusear este medicamento veterinário com grande cuidado para evitar exposições, tomando todas as precauções recomendadas.

Se desenvolver sintomas após a exposição, tais como erupções cutâneas, deverá procurar aconselhamento médico e apresentar este aviso ao médico. Inchaço da face, lábios ou olhos ou dificuldade respiratória são sintomas mais graves e requerem atenção médica urgente.

Utilização durante a gestação, a lactação ou a postura de ovos

Estudos de laboratório efetuados com ratos não produziram qualquer prova de efeitos teratogénicos, devido à administração de amoxicilina.

Administrar apenas após análise da relação benefício/risco pelo médico veterinário responsável.

Sobredosagem (sintomas, procedimentos de emergência, antídotos)

Não foram observados efeitos secundários após a administração de 5 vezes a dose recomendada. O tratamento deverá ser sintomático e não se encontra disponível nenhum antídoto.

Interações medicamentosas e outras formas de interação

A amoxicilina exerce o seu efeito bactericida inibindo a síntese da parede das células bacterianas durante a multiplicação.

Em princípio não é compatível com antibióticos bacteriostáticos (ex. tetraciclina, macrólidos e sulfonamidas) que inibem a multiplicação. Sinergismo ocorre com antibióticos β -lactâmicos e aminoglicosídeos.

Não administrar simultaneamente com neomicina, visto que esta bloqueia a absorção das penicilinas orais.

Incompatibilidades

Visto não terem sido efetuados estudos de compatibilidade, este medicamento veterinário não deverá ser misturado com outros medicamentos veterinários.

13. PRECAUÇÕES ESPECIAIS DE ELIMINAÇÃO DO MEDICAMENTO NÃO UTILIZADO OU DOS SEUS DESPERDÍCIOS, SE FOR CASO DISSO

O medicamento veterinário não utilizado ou os seus desperdícios devem ser eliminados de acordo com os requisitos nacionais.

14. DATA DA ÚLTIMA APROVAÇÃO DO FOLHETO INFORMATIVO

Setembro de 2022.

15. OUTRAS INFORMAÇÕES

Tamanhos de embalagem: 100 g, 500 g, 1000 g, 5000 g.

É possível que não sejam comercializadas todas as apresentações.

Medicamento veterinário sujeito a receita médico-veterinária.

N.º de AIM: 708/01/13DFVPT.

Distribuidor

Virbac de Portugal de Portugal Laboratórios
Beloura Office Park
Ed 13- Piso 1, Escr3
Quinta da Beloura
2710-444 Sintra