

## **ANEXO I**

### **RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO MEDICAMENTO VETERINÁRIO**

## 1. NOME DO MEDICAMENTO VETERINÁRIO

Fyperix Combo 50 mg/60 mg solução para unção punctiforme para gatos

## 2. COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA

Cada pipeta de 0,5 ml contém:

### Substâncias ativas:

Fipronil	50 mg
S-Metopreno	60 mg

### Excipientes:

Composição qualitativa dos excipientes e outros componentes	Composição quantitativa, se esta informação for essencial para a administração adequada do medicamento veterinário
Butil-hidroxianisol (E320)	0,1 mg
Butil-hidroxitolueno (E321)	0,05 mg
Povidona (K25)	
Polissorbato 80	
Etanol 96%	
Éter monoetílico de dietilenoglicol	

Solução amarela límpida.

## 3. INFORMAÇÃO CLÍNICA

### 3.1 Espécies-alvo

Felinos (gatos).

### 3.2 Indicações de utilização para cada espécie-alvo

Para ser usado contra infestações por pulgas, isoladamente ou em associação com carrças e/ou piolhos mordedores:

- Tratamento de pulgas (*Ctenocephalides* spp.). A eficácia inseticida contra novas infestações de pulgas adultas persiste durante 4 semanas. Prevenção da multiplicação das pulgas, por inibição do desenvolvimento dos ovos (atividade ovicida) e das larvas e pupas (atividade larvicida) descendentes de ovos postos pelas pulgas adultas, durante 6 semanas após aplicação.
- Tratamento de carrças (*Ixodes ricinus*, *Dermacentor variabilis*, *Rhipicephalus sanguineus*). O medicamento veterinário tem uma eficácia acaricida persistente até 2 semanas contra carrças (com base em dados experimentais).

- Tratamento de piolhos mordedores (*Felicola subrostratus*).

### 3.3 Contraindicações

Não administrar em gatinhos com menos de 8 semanas de idade e/ou pesando menos de 1 kg.

Não administrar a animais doentes (p. ex., doenças sistémicas, febre) ou convalescentes.

Não administrar em caso de hipersensibilidade às substâncias ativas ou a algum dos excipientes.

**Não administrar em coelhos, uma vez que podem ocorrer reações adversas ou até a morte.**

Não administrar a outras espécies não-alvo.

### 3.4 Advertências especiais

Ao tratar infestações de parasitas, todos os animais em contacto devem ser tratados ao mesmo tempo com um medicamento veterinário adequado. As pulgas dos animais de estimação infestam muitas vezes o cesto do animal, a cama e as áreas normais de repouso, como as alcatifas e tecidos em geral, os quais devem ser tratados em caso de infestação massiva e ao iniciar as medidas de controlo, aplicando um inseticida adequado e aspirando regularmente.

Devem-se evitar os banhos e champôs. Não existem dados disponíveis sobre o efeito do banho e de champôs na eficácia do medicamento veterinário em gatos. Baseado na informação disponível para cães, banho/imersão em água nos dois dias seguintes à aplicação do medicamento veterinário e banhos com frequência superior a uma vez por semana devem ser evitados.

### 3.5 Precauções especiais de utilização

#### Precauções especiais para a utilização segura nas espécies-alvo:

Evite o contacto com os olhos do animal.

É importante ter a certeza de que o medicamento veterinário é aplicado numa zona onde o animal não possa lambar-se, e ter a certeza de que os animais não se lambam entre eles após o tratamento.

Pode verificar-se a fixação de carraças isoladas. Por esta razão a transmissão de doenças infecciosas não pode ser completamente excluída, se as condições forem desfavoráveis.

Não se encontra documentada a toxicidade potencial do medicamento veterinário para gatinhos com menos de 8 semanas de idade em contacto com a mãe tratada. Neste caso deve ser tomado especial cuidado.

#### Precauções especiais a adotar pela pessoa que administra o medicamento veterinário aos animais:

Este medicamento veterinário pode causar irritação nas mucosas, na pele e nos olhos. Por isso deve ser evitado o contacto com a boca, a pele e os olhos.

Deve ser evitado o contacto de pessoas com hipersensibilidade (alergia) conhecida a inseticidas ou ao álcool com o medicamento veterinário. Deve evitar-se o contacto com os dedos. No caso de contacto, lavar as mãos com água e sabão.

Depois de contacto acidental com os olhos, enxaguar cuidadosamente com água potável.

Em caso de ingestão acidental, procurar imediatamente aconselhamento médico e mostrar o folheto informativo ou rótulo da embalagem ao médico.

Lavar as mãos após a aplicação do medicamento veterinário.

Não fumar, beber ou comer durante a aplicação.

Enquanto o local de aplicação não estiver completamente seco, os animais tratados não devem ser manuseados nem se deve permitir que as crianças brinquem com eles. Por conseguinte é recomendado que os animais não sejam tratados durante o dia, mas sim ao entardecer, e que os animais recentemente tratados não durmam com os donos, especialmente com as crianças. Conserve as pipetas na embalagem original até ao momento de utilizar.

Precauções especiais para a proteção do ambiente:

Não aplicável.

### 3.6 Eventos adversos

Felinos (gatos):

Muito raros (<1 animal / 10 000 animais tratados, incluindo notificações isoladas):	Reações cutâneas no local de aplicação (descamação, alopécia local, prurido, vermelhidão) <sup>1</sup> Perturbações da pele e anexos (prurido, queda de pelo)
Frequência desconhecida (não pode ser calculada a partir dos dados disponíveis):	Perturbações no trato digestivo (hipersalivação, vômitos) Perturbações neurológicas (aumento da sensibilidade à estimulação, depressão, outros sinais nervosos) <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Transitórios.

<sup>2</sup> Reversíveis.

No caso de o animal lamber o local de administração, pode observar-se um breve período de hipersalivação, devida, principalmente à natureza do veículo.

A notificação de eventos adversos é importante. Permite a monitorização contínua da segurança de um medicamento veterinário. As notificações devem ser enviadas, de preferência por um médico veterinário, ao titular da Autorização de Introdução no Mercado ou representante local ou à autoridade nacional competente através do sistema nacional de farmacovigilância veterinária. Para obter informações de contacto, consulte o Folheto Informativo.

### 3.7 Utilização durante a gestação, a lactação ou a postura de ovos

Gestação e lactação:

Pode ser administrado durante a gestação.  
Ver secção 3.5.

### 3.8 Interação com outros medicamentos e outras formas de interação

Não utilizar em simultâneo com outros medicamentos veterinários contra pulgas que sejam aplicados diretamente sobre o animal.

### 3.9 Posologia e via de administração


Solução para unção punctiforme.

Uma pipeta de 0,5 ml por gato, correspondendo a uma dose mínima recomendada de 5 mg/kg de fipronil e 6 mg/kg de (S)-metopreno, por aplicação tópica na pele.

Na ausência de estudos de segurança, o intervalo mínimo entre os tratamentos é de 4 semanas.

Modo de administração:

1. Remover a pipeta do invólucro. Segurar a pipeta de pé, rodar e puxar a tampa para fora.
2. Virar a tampa e colocar a outra extremidade novamente na pipeta. Empurrar e rodar para quebrar o selo, e depois remover a tampa.
3. Afastar os pelos do dorso do animal, na base do pescoço, na linha das escápulas, até que a pele fique visível. Colocar a ponta da pipeta junto à pele e apertá-la várias vezes, para esvaziar completamente o seu conteúdo diretamente sobre a pele, num ponto de aplicação.



### **3.10 Sintomas de sobredosagem (e, quando aplicável, procedimentos de emergência e antídotos)**

O risco de ocorrência de reações adversas pode aumentar com a sobredosagem (ver secção 3.6).

Não foi observado qualquer efeito indesejável em estudos de segurança nas espécies-alvo em gatos e gatinhos com 8 ou mais semanas de idade, e pesando cerca de 1 kg, tratados mensalmente com até 5 vezes a dose recomendada durante seis meses consecutivos.

Pode ocorrer prurido após a aplicação.

A aplicação excessiva do medicamento veterinário causa um aspeto pegajoso dos pelos no local da aplicação. No entanto, caso isso aconteça, este desaparece dentro de 24 horas após a aplicação.

### **3.11 Restrições especiais de utilização e condições especiais de utilização, incluindo restrições à utilização de medicamentos veterinários antimicrobianos e antiparasitários, a fim de limitar o risco de desenvolvimento de resistência**

Não aplicável.

### **3.12 Intervalos de segurança**

Não aplicável.

## **4. PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS**

### **4.1 Código ATCvet: QP53AX65.**

### **4.2 Propriedades farmacodinâmicas**

O fipronil é um inseticida e acaricida pertencente à família dos fenilpirazóis. Atua, interagindo com os canais de cloro-ligantes, em especial os terminados pelo neurotransmissor ácido gama-aminobutírico

(GABA), bloqueando, deste modo, a transferência pré e pós-sináptica dos iões cloro, através da membrana celular. Isto resulta na atividade não controlada do sistema nervoso central e morte dos insetos ou acarinos. O fipronil mata pulgas dentro de 24 horas, e carraças (*Dermacentor variabilis*, *Rhipicephalus sanguineus*, *Ixodes ricinus*) assim como piolhos, dentro de 48 horas após exposição.

O (S)-metopreno é um Regulador do Crescimento dos Insetos (RCI) da classe das hormonas juvenis que inibem o desenvolvimento dos estadios imaturos dos insetos. Este composto imita a ação da hormona juvenil e causa o desenvolvimento deficiente e morte dos estadios de desenvolvimento das pulgas. A atividade ovcida do (S)-metopreno resulta da penetração do invólucro de ovos recentemente postos ou da absorção através da cutícula das pulgas adultas. O (S)-metopreno também é eficaz na prevenção do desenvolvimento das larvas e pupas de pulgas, o que permite evitar a contaminação do ambiente dos animais pelos estadios imaturos das pulgas.

### 4.3 Propriedades farmacocinéticas

Estudos do metabolismo do fipronil demonstraram que o principal metabolito é a sulfona de fipronil. O (S)-metopreno é extensivamente degradado em dióxido de carbono e acetato que são, subsequentemente, incorporados em materiais endógenos.

O comportamento farmacocinético após a aplicação tópica, da combinação fipronil/(S)-metopreno foi estudado em gatos, em comparação com o doseamento intravenoso do fipronil ou do (S)-metopreno isoladamente. Isto estabelece a absorção e outros parâmetros farmacocinéticos em condições equivalentes às da prática clínica. A aplicação tópica, com adicional potencial exposição oral por lambedura, resultou numa baixa absorção sistémica do fipronil (18%) com uma concentração máxima ( $C_{max}$ ) aproximadamente de 100 ng/ml de fipronil e 13 ng/ml de fipronil sulfona no plasma. Os picos da concentração plasmática de fipronil são rapidamente alcançados (significando um  $t_{max}$  aproximadamente de 6 h), e diminuem com uma semivida terminal de 25 h. O fipronil é metabolizado em fipronil sulfona nos gatos.

As concentrações plasmáticas de (S)-metopreno estavam geralmente abaixo do limite quantificável (20 ng/ml) em gatos após aplicação tópica.

Tanto o (S)-metopreno como o fipronil, em conjunto com o seu maior metabolito, são bem distribuídos na pelagem de um gato, dentro de um dia, após aplicação. As concentrações de fipronil, sulfona do fipronil e (S)-metopreno no pelo decrescem com o tempo sendo detetados, pelo menos, 59 dias após a aplicação. Os parasitas são mortos através do contacto e não pela ação sistémica. Não foram observadas interações farmacológicas entre o fipronil e o (S)-metopreno.

## 5. INFORMAÇÕES FARMACÊUTICAS

### 5.1 Incompatibilidades principais

Desconhecidas.

### 5.2 Prazo de validade

Prazo de validade do medicamento veterinário tal como embalado para venda: 2 anos.

### 5.3 Precauções especiais de conservação

Conservar a temperatura inferior a 30°C.  
Conservar na embalagem de origem para proteger da luz e da humidade.

#### **5.4 Natureza e composição do acondicionamento primário**

Pipeta unidose de polipropileno branco, acondicionada em saqueta de alumínio.

##### Embalagens:

Caixa de cartão contendo 1, 3, 6 ou 30 pipetas.  
É possível que não sejam comercializadas todas as apresentações.

#### **5.5 Precauções especiais para a eliminação de medicamentos veterinários não utilizados ou de desperdícios derivados da utilização desses medicamentos**

Os medicamentos não devem ser eliminados no lixo ou nos esgotos domésticos.

O medicamento veterinário não deve ser eliminado nos cursos de água, porque o fipronil e o S-metopreno podem constituir perigo para os peixes e outros organismos aquáticos.

Utilize regimes de recolha de medicamentos veterinários para a eliminação de medicamentos veterinários não utilizados ou de resíduos resultantes da utilização desses medicamentos, em cumprimento dos requisitos nacionais e de quaisquer sistemas de recolha nacionais aplicáveis ao medicamento veterinário em causa.

### **6. NOME DO TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO**

KRKA, d.d., Novo mesto

### **7. NÚMERO(S) DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO**

1187/01/18DFVPT

### **8. DATA DA PRIMEIRA AUTORIZAÇÃO**

Data da primeira autorização: 10 de abril de 2018.

### **9. DATA DA ÚLTIMA REVISÃO DO RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO MEDICAMENTO VETERINÁRIO**

02/2025

### **10. CLASSIFICAÇÃO DOS MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS**

Medicamento veterinário não sujeito a receita médico-veterinária.

Está disponível informação pormenorizada sobre este medicamento veterinário na base de dados de medicamentos da União Europeia [Union Product Database](https://medicines.health.europa.eu/veterinary) (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

**ANEXO III**

**ROTULAGEM E FOLHETO INFORMATIVO**

## **A. ROTULAGEM**

## INDICAÇÕES A INCLUIR NO ACONDICIONAMENTO SECUNDÁRIO

{CAIXA}

### 1. NOME DO MEDICAMENTO VETERINÁRIO

Fyperix Combo 50 mg/60 mg solução para unção punctiforme

### 2. DESCRIÇÃO DAS SUBSTÂNCIAS ATIVAS

Cada pipeta de 0,5 ml contém:

Fipronil	50 mg
S-metopreno	60 mg

### 3. DIMENSÃO DA EMBALAGEM

1 x 0,5 ml  
3 x 0,5 ml  
6 x 0,5 ml  
30 x 0,5 ml

### 4. ESPÉCIES-ALVO

Felinos (Gatos)



### 5. INDICAÇÕES

Mata pulgas (*Ctenocephalides* spp.) em gatos até 4 semanas após a aplicação do tratamento e evita que os ovos postos pelas pulgas expostas se desenvolvam até 6 semanas após a aplicação do tratamento. Mata carrças (*Ixodes ricinus*, *Dermacentor variabilis*, *Rhipicephalus sanguineus*) em gatos até 2 semanas após a aplicação do tratamento. Trata infestações com piolhos mordedores (*Felicola subrostratus*).



*Ctenocephalides felis*




*Ixodida*



*Felicola subrostratus*

## 6. VIAS DE ADMINISTRAÇÃO

Solução para unção punctiforme.



## 7. INTERVALOS DE SEGURANÇA

## 8. PRAZO DE VALIDADE

Exp.

## 9. PRECAUÇÕES ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO

Conservar a temperatura inferior a 30°C.  
Conservar na embalagem de origem para proteger da luz e da humidade.

## 10. MENÇÃO "Antes de administrar, ler o folheto informativo"

Antes de administrar, ler o folheto informativo.

## 11. MENÇÃO "USO VETERINÁRIO"

USO VETERINÁRIO

USO EXTERNO

Medicamento veterinário não sujeito a receita médico-veterinária.

## 12. MENÇÃO "MANTER FORA DA VISTA E DO ALCANCE DAS CRIANÇAS"

Manter fora da vista e do alcance das crianças.

**13. NOME DO TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO**

Titular da Autorização de Introdução no Mercado:

KRKA, d.d., Novo mesto

Representante local:

BELPHAR, Lda

**14. NÚMEROS DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO**

1187/01/18DFVPT

**15. NÚMERO DO LOTE**

Lot

**INDICAÇÕES MÍNIMAS A INCLUIR EM PEQUENAS UNIDADES DE  
ACONDICIONAMENTO PRIMÁRIO**

{SAQUETA}

**1. NOME DO MEDICAMENTO VETERINÁRIO**

Fyperix Combo



**2. INFORMAÇÕES QUANTITATIVAS SOBRE AS SUBSTÂNCIAS ATIVAS**

fipronil/s-methoprene  
50 mg/60 mg


**3. NÚMERO DO LOTE**

Lot

**4. PRAZO DE VALIDADE**

Exp.

KRKA, d.d., Novo mesto



**INDICAÇÕES MÍNIMAS A INCLUIR EM PEQUENAS UNIDADES DE  
ACONDICIONAMENTO PRIMÁRIO**

{PIPETA}

**1. NOME DO MEDICAMENTO VETERINÁRIO**

Fyperix Combo



**2. INFORMAÇÕES QUANTITATIVAS SOBRE AS SUBSTÂNCIAS ATIVAS**

50 mg/60 mg

**3. NÚMERO DO LOTE**

Lot

**4. PRAZO DE VALIDADE**

Exp.

## **B. FOLHETO INFORMATIVO**

## FOLHETO INFORMATIVO

### 1. Nome do medicamento veterinário

Fyperix Combo 50 mg/60 mg solução para unção punctiforme para gatos

### 2. Composição

Cada pipeta de 0,5 ml contém:

#### Substâncias ativas:

Fipronil	50 mg
S-Metopreno	60 mg

#### Excipientes:

Butil-hidroxianisol (E320)	0,1 mg
Butil-hidroxitolueno (E321)	0,05 mg

Solução amarela límpida.

### 3. Espécies-alvo

Felinos (gatos).



### 4. Indicações de utilização

Para ser usado contra infestações por pulgas, isoladamente ou em associação com carraças e/ou piolhos mordedores:

- Tratamento de pulgas (*Ctenocephalides* spp.). A eficácia inseticida contra novas infestações de pulgas adultas persiste durante 4 semanas. Prevenção da multiplicação das pulgas, por inibição do desenvolvimento dos ovos (atividade ovicida) e das larvas e pupas (atividade larvicida) descendentes de ovos postos pelas pulgas adultas, durante 6 semanas após aplicação.
- Tratamento de carraças (*Ixodes ricinus*, *Dermacentor variabilis*, *Rhipicephalus sanguineus*). O medicamento veterinário tem uma eficácia acaricida persistente até 2 semanas contra carraças (com base em dados experimentais).
- Tratamento de piolhos mordedores (*Felicola subrostratus*).

## 5. Contraindicações

Não administrar em gatinhos com menos de 8 semanas de idade e/ou pesando menos de 1 kg.  
Não administrar a animais doentes (p. ex., doenças sistémicas, febre) ou convalescentes.  
Não administrar em caso de hipersensibilidade às substâncias ativas ou a algum dos excipientes.  
**Não administrar em coelhos, uma vez que podem ocorrer reações adversas ou até a morte.**  
Não administrar a outras espécies não-alvo.

## 6. Advertências especiais

### Advertências especiais:

Ao tratar infestações de parasitas, todos os animais em contacto devem ser tratados ao mesmo tempo com um medicamento veterinário adequado. As pulgas dos animais de estimação infestam muitas vezes o cesto do animal, a cama e as áreas normais de repouso, como as alcatifas e tecidos em geral, os quais devem ser tratados em caso de infestação massiva e ao iniciar as medidas de controlo, aplicando um inseticida adequado e aspirando regularmente.

Devem-se evitar os banhos e champôs. Não existem dados disponíveis sobre o efeito do banho e de champôs na eficácia do medicamento veterinário em gatos. Baseado na informação disponível para cães, banho/imersão em água nos dois dias seguintes à aplicação do medicamento veterinário e banhos com frequência superior a uma vez por semana devem ser evitados.

### Precauções especiais para uma utilização segura nas espécies-alvo:

Evite o contacto com os olhos do animal.

É importante ter a certeza de que o medicamento veterinário é aplicado numa zona onde o animal não possa lambê-lo, e ter a certeza de que os animais não se lambem entre eles após o tratamento.

Pode verificar-se a fixação de carraças isoladas. Por esta razão a transmissão de doenças infecciosas não pode ser completamente excluída, se as condições forem desfavoráveis.

### Precauções especiais a adotar pela pessoa que administra o medicamento veterinário aos animais:

Este medicamento veterinário pode causar irritação nas mucosas, na pele e nos olhos. Por isso deve ser evitado o contacto com a boca, a pele e os olhos.

Deve ser evitado o contacto de pessoas com hipersensibilidade (alergia) conhecida a inseticidas ou ao álcool com o medicamento veterinário. Deve evitar-se o contacto com os dedos. No caso de contacto, lavar as mãos com água e sabão.

Depois de contacto acidental com os olhos, enxaguar cuidadosamente com água potável.

Em caso de ingestão acidental, procurar imediatamente aconselhamento médico e mostrar o folheto informativo ou rótulo da embalagem ao médico.

Lavar as mãos após a aplicação do medicamento veterinário.

Não fumar, beber ou comer durante a aplicação.

Enquanto o local de aplicação não estiver completamente seco, os animais tratados não devem ser manuseados nem se deve permitir que as crianças brinquem com eles. Por conseguinte é recomendado que os animais não sejam tratados durante o dia, mas sim ao entardecer, e que os animais recentemente tratados não durmam com os donos, especialmente com as crianças.

Conserve as pipetas na embalagem original até ao momento de utilizar.

#### Gestação e lactação:

Pode ser administrado durante a gestação.

A potencial toxicidade do medicamento veterinário em gatinhos com menos de 8 semanas de idade em contacto com uma gata tratada não está documentada.

#### Interação com outros medicamentos e outras formas de interação:

Não administrar simultaneamente com outros medicamentos veterinários contra pulgas aplicados diretamente no animal.

#### Sobredosagem:

O risco de reações adversas pode, contudo, aumentar com sobredosagem (ver secção “Eventos Adversos”).

Não foi observada qualquer reação adversa em gatos e gatinhos, sujeitos a estudos de segurança nas espécies-alvo, com 8 ou mais semanas de idade, e pesando cerca de 1 kg, tratados mensalmente com até 5 vezes a dose recomendada durante seis meses consecutivos.

Pode ocorrer prurido após a aplicação.

A aplicação excessiva do medicamento veterinário causa um aspeto pegajoso dos pelos no local da aplicação. No entanto, caso isso aconteça, este desaparece dentro de 24 horas após a aplicação.

## **7. Eventos adversos**

Felinos (gatos):

Muito raros (<1 animal / 10 000 animais tratados, incluindo notificações isoladas):	Reações cutâneas no local de aplicação (descamação, alopécia local, prurido, vermelhidão) <sup>1</sup> Perturbações da pele e anexos (prurido, queda de pelo)
Frequência desconhecida (não pode ser calculada a partir dos dados disponíveis):	Perturbações no trato digestivo (hipersalivação, vômitos) Perturbações neurológicas (aumento da sensibilidade à estimulação, depressão, outros sinais nervosos) <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Transitórios.

<sup>2</sup> Reversíveis.

No caso de o animal lambem o local de administração, pode observar-se um breve período de hipersalivação, devida, principalmente à natureza do veículo.

A notificação de eventos adversos é importante. Permite a monitorização contínua da segurança de um medicamento veterinário. Caso detete quaisquer efeitos mencionados neste folheto ou outros efeitos mesmo que não mencionados, ou pense que o medicamento veterinário não foi eficaz, informe o seu médico veterinário. Também pode comunicar quaisquer eventos adversos ao titular da Autorização de Introdução no Mercado utilizando os dados de contacto no final deste folheto, ou através do Sistema Nacional de Farmacovigilância Veterinária (SNFV): [farmacovigilancia.vet@dgav.pt](mailto:farmacovigilancia.vet@dgav.pt).


## **8. Dosagem em função da espécie, via e modo de administração**

Solução para unção punctiforme.

Uma pipeta de 0,5 ml por gato, correspondendo a uma dose mínima recomendada de 5 mg/kg de fipronil e 6 mg/kg de (S)-metopreno, por aplicação tópica na pele.

Modo de administração:

1. Remover a pipeta do invólucro. Segurar a pipeta de pé, rodar e puxar a tampa para fora.
2. Virar a tampa e colocar a outra extremidade novamente na pipeta. Empurrar e rodar para quebrar o selo, e depois remover a tampa.
3. Afastar os pelos do dorso do animal, na base do pescoço, na linha das escápulas, até que a pele fique visível. Colocar a ponta da pipeta junto à pele e apertá-la várias vezes, para esvaziar completamente o seu conteúdo diretamente sobre a pele, num ponto de aplicação.



#### **9. Instruções com vista a uma administração correta**

Na ausência de estudos de segurança, o intervalo mínimo entre os tratamentos é de 4 semanas.

#### **10. Intervalos de segurança**

Não aplicável.

#### **11. Precauções especiais de conservação**

Manter fora da vista e do alcance das crianças.

Conservar a temperatura inferior a 30°C.

Conservar na embalagem de origem para proteger da luz e da humidade.

Não utilizar este medicamento veterinário depois de expirado o prazo de validade indicado no rótulo e na embalagem depois de Exp. O prazo de validade corresponde ao último dia do mês indicado.

#### **12. Precauções especiais de eliminação**

Os medicamentos não devem ser eliminados no lixo ou nos esgotos domésticos.

Este medicamento veterinário não deve ser eliminado nos cursos de água, porque o fipronil e o (S)-metopreno podem constituir perigo para os peixes e outros organismos aquáticos.

Utilize regimes de recolha de medicamentos veterinários para a eliminação de medicamentos veterinários não utilizados ou de resíduos resultantes da utilização desses medicamentos, em

cumprimento dos requisitos nacionais e de quaisquer sistemas de recolha nacionais aplicáveis. Estas medidas destinam-se a ajudar a proteger o ambiente.

Pergunte ao seu médico veterinário ou farmacêutico como deve eliminar os medicamentos veterinários que já não são necessários.

### **13. Classificação dos medicamentos veterinários**

Medicamento veterinário não sujeito a receita médico-veterinária.

### **14. Números de autorização de introdução no mercado e tamanhos de embalagem**

1187/01/18DFVPT

Pipeta unidose de polipropileno branco, acondicionada em saqueta de alumínio.

#### Embalagens:

Caixa de cartão contendo 1, 3, 6 ou 30 pipetas.

É possível que não sejam comercializadas todas as apresentações.

### **15. Data em que o folheto informativo foi revisto pela última vez**

02/2025

Está disponível informação pormenorizada sobre este medicamento veterinário na base de dados de medicamentos da União Europeia [Union Product Database](https://medicines.health.europa.eu/veterinary) (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

### **16. Detalhes de contacto**

Titular da Autorização de Introdução no Mercado e fabricante responsável pela libertação do lote e detalhes de contacto para comunicar suspeitas de eventos adversos:

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Eslovénia

Tel: +351 214 643 650

[Pharmacovigilance.PT@krka.biz](mailto:Pharmacovigilance.PT@krka.biz)

Representante local:

BELPHAR, Lda, Sintra Business Park, N°7, Edifício 1 - Escritório 2K, Zona Industrial de Abrunheira, 2710-089 Sintra

### **17. Outras informações**

MVG