ANEXO I

RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO MEDICAMENTO VETERINÁRIO

1. NOME DO MEDICAMENTO VETERINÁRIO

Rispoval RS+PI3 IntraNasal spray nasal, liofilizado e solvente para suspensão para bovinos

2. COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA

Cada dose de 2 ml contém:

Substâncias ativas:

Liofilizado:
Vírus da parainfluenza bovina tipo 3 (PI3V), estirpe RLB 103, vivo $10^{5.0}$ - $10^{8.6}$ $DICC_{50}$.
Vírus respiratório sincicial bovino (BRSV), estirpe 375, vivo $10^{5.0}$ - $10^{7.2}$ $DICC_{50}$.

$DICC_{50}$: 50% da dose infecciosa em cultura celular.

Excipientes:

Composição qualitativa dos excipientes e outros componentes
Liofilizado:
Solução de lactose tamponada
Solução de gelatina
Solução de caseína hidrolisada
Meio HALS
Solvente:
Cloreto de sódio
Água para injetáveis

Liofilizado: pastilha liofilizada de coloração ligeiramente esbranquiçada a amarelada.
Solvente: líquido límpido e incolor, isento de impurezas visíveis.

3. INFORMAÇÃO CLÍNICA

3.1 Espécies-alvo

Bovinos.

3.2 Indicações de utilização para cada espécie-alvo

Para vacinação apenas com Rispoval RS+PI3 IntraNasal:
Para a imunização ativa de vitelos, positivos ou negativos a anticorpos de origem materna, a partir dos 9 dias de idade, contra BRSV e PI3V, para reduzir o título médio e a duração da excreção de ambos os vírus.

Início da imunidade: 5 dias para BRSV e 10 dias para PI3V, após uma única administração.
Duração da imunidade: 12 semanas após uma única administração. A duração da imunidade protetora contra a fração PI3V pode ser reduzida em vitelos positivos a anticorpos de origem materna vacinados antes das 3 semanas de idade.

Para primovacinação com Rispoval RS+PI3 IntraNasal seguida de vacinação de reforço com Rispoval 2/BRSV + Pi3*, consultar a informação do medicamento veterinário Rispoval 2/BRSV + Pi3*, para detalhes específicos sobre as indicações.

*Onde este medicamento veterinário estiver autorizado.

3.3 Contraindicações

Não existentes.

3.4 Advertências especiais

Vacinar apenas animais saudáveis.

Os animais devem ser vacinados, preferencialmente, pelo menos 10 dias antes de um período de stress ou de elevado risco de infeção, como o reagrupamento ou o transporte dos animais, ou no início da estação de outono. Para obter resultados otimizados, recomenda-se a vacinação de todos os vitelos dentro do mesmo efetivo.

3.5 Precauções especiais de utilização

Precauções especiais para a utilização segura nas espécies-alvo:

Os vírus vacinais podem disseminar-se de vitelos vacinados para vitelos não vacinados e podem provocar uma resposta sorológica, mas sem causar sinais clínicos. Em ensaios laboratoriais, com base em dados envolvendo animais de 3 semanas de idade, observou-se excreção de BRSV e PI3V até 11 e 7 dias, respetivamente, após a administração de uma dose contendo o título máximo de vírus.

Precauções especiais a adotar pela pessoa que administra o medicamento veterinário aos animais:

Não aplicável.

Precauções especiais para a proteção do ambiente:

Não aplicável.

3.6 Eventos adversos

Bovinos:

Raros (1 a 10 animais / 10 000 animais tratados):	Reação de hipersensibilidade (por exemplo, reação do tipo anafilático)

A notificação de eventos adversos é importante. Permite a monitorização contínua da segurança de um medicamento veterinário. As notificações devem ser enviadas, de preferência por um médico

veterinário, ao Titular da Autorização de Introdução no Mercado ou à autoridade nacional competente através do Sistema Nacional de Farmacovigilância Veterinária. Consulte o folheto informativo para obter os respetivos detalhes de contacto.

3.7 Utilização durante a gestação, a lactação ou a postura de ovos

Gestação e lactação:

A segurança do medicamento veterinário não foi determinada durante a gestação e lactação. Não administrar durante a gestação e lactação.

3.8 Interação com outros medicamentos e outras formas de interação

Não existe informação disponível sobre a segurança e a eficácia desta vacina quando utilizada com qualquer outro medicamento veterinário. A decisão da administração desta vacina antes ou após a administração de outro medicamento veterinário, deve ser tomada caso a caso.

3.9 Posologia e via de administração

Dose: 2 ml.

Via: administração nasal.

Reconstituição da vacina:

Reconstituir as apresentações de 1 dose e de 5 doses, adicionando asseticamente o solvente ao frasco contendo o liofilizado. Agitar bem antes da administrar.

Reconstituir a apresentação de 25 doses misturando a fração liofilizada com o solvente em 2 etapas:
1. Injetar 10 ml de solvente sobre a pastilha liofilizada, no frasco contendo o liofilizado.
2. Agitar bem e extrair a fração liofilizada reconstituída do frasco, misturando-a com o restante solvente no frasco da fração líquida.

Agitar bem antes de administrar.

Vacina reconstituída: líquido cor-de-rosa a cor de laranja, que pode conter um sedimento solto e ressuspendível.

Programa de vacinação:
Vacinação básica: Deve ser administrada uma dose única de 2 ml de vacina reconstituída, utilizando o aplicador intranasal disponibilizado pela Zoetis, a bovinos a partir dos 9 dias de idade. Recomenda-se mudar de aplicador entre animais para evitar a transmissão de organismos infeciosos.

Para primovacinação com Rispoval RS+PI3 IntraNasal seguida de vacinação de reforço com Rispoval 2/BRSV + Pi3*, consultar a informação do medicamento veterinário Rispoval 2/BRSV + Pi3*, para detalhes específicos sobre o programa de vacinação.

*Onde este medicamento veterinário estiver autorizado.

3.10 Sintomas de sobredosagem (e, quando aplicável, procedimentos de emergência e antídotos)

Em animais privados de colostro e vacinados antes das 3 semanas de idade com uma sobredosagem de 10 vezes, observaram-se aumentos transitórios da temperatura, diarreia nutricional, fezes anómalas e alterações do comportamento.

3.11 Restrições especiais de utilização e condições especiais de utilização, incluindo restrições à utilização de medicamentos veterinários antimicrobianos e antiparasitários, a fim de limitar o risco de desenvolvimento de resistência

Não aplicável.

3.12 Intervalos de segurança

Zero dias.

4. PROPRIEDADES IMUNOLÓGICAS

4.1 Código ATCvet: QI02AD07

Para estimular a imunidade ativa contra BRSV e PI3V.

5. INFORMAÇÕES FARMACÊUTICAS

5.1 Incompatibilidades principais

Não misturar com qualquer outro medicamento veterinário, exceto com o solvente fornecido para utilização com este medicamento veterinário.

5.2 Prazo de validade

Prazo de validade do medicamento veterinário tal como embalado para venda (apresentações de 5 e de 25 doses: 2 anos.
Prazo de validade do medicamento veterinário tal como embalado para venda (apresentação de 1 dose: 1 ano.
Prazo de validade após reconstituição de acordo com as instruções: 2 horas.

5.3 Precauções especiais de conservação

Conservar e transportar refrigerado (2 ºC – 8 ºC).
Não congelar.
Proteger da luz.

5.4 Natureza e composição do acondicionamento primário

Caixa de cartão com 1 frasco de vidro contendo 5 ou 25 doses de liofilizado, acompanhado de 1 frasco de vidro contendo, respetivamente, 10 ou 50 ml de solvente. Ambos os frascos têm rolha de borracha e cápsula de alumínio.

Caixa de plástico com 5 frascos de vidro de 1 dose de liofilizado, acompanhados de 5 frascos de vidro contendo 2 ml de solvente. Ambos os frascos têm rolha de borracha e cápsula de alumínio.

É possível que não sejam comercializadas todas as apresentações.

5.5 Precauções especiais para a eliminação de medicamentos veterinários não utilizados ou de desperdícios derivados da utilização desses medicamentos

Os medicamentos não devem ser eliminados no lixo ou nos esgotos domésticos.

Utilize regimes de recolha de medicamentos veterinários para a eliminação de medicamentos veterinários não utilizados ou de resíduos resultantes da utilização desses medicamentos, em cumprimento dos requisitos nacionais e de quaisquer sistemas de recolha nacionais aplicáveis ao medicamento veterinário em causa.

6. NOME DO TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO

Zoetis Portugal, Lda.

7. NÚMERO(S) DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO

AIM n.º 819/09RIVPT.

8. DATA DA PRIMEIRA AUTORIZAÇÃO

Data da primeira autorização: 9 de junho de 2009.

9. DATA DA ÚLTIMA REVISÃO DO RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO MEDICAMENTO VETERINÁRIO

10/2026

10. CLASSIFICAÇÃO DOS MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS

Medicamento veterinário sujeito a receita médico-veterinária.

Está disponível informação pormenorizada sobre este medicamento veterinário na base de dados de medicamentos da União Europeia Union Product Database (https://medicines.health.europa.eu/veterinary).

ANEXO III

ROTULAGEM E FOLHETO INFORMATIVO

A. ROTULAGEM

INDICAÇÕES A INCLUIR NO ACONDICIONAMENTO SECUNDÁRIO

CAIXA DE CARTÃO (5 OU 25 DOSES)

1. NOME DO MEDICAMENTO VETERINÁRIO

Rispoval RS+PI3 IntraNasal spray nasal, liofilizado e solvente para suspensão

2. DESCRIÇÃO DAS SUBSTÂNCIAS ATIVAS

Cada dose de 2 ml contém:

Vírus da parainfluenza bovina tipo 3 (PI3V), estirpe RLB 103, vivo $10^{5.0}$ - $10^{8.6}$ $DICC_{50}$.
Vírus respiratório sincicial bovino (BRSV), estirpe 375, vivo $10^{5.0}$ - $10^{7.2}$ $DICC_{50}$.

3. DIMENSÃO DA EMBALAGEM

1 x 5 doses
1 x 25 doses

4. ESPÉCIES-ALVO

Bovinos.

5. INDICAÇÕES

6. VIAS DE ADMINISTRAÇÃO

Administração nasal.

7. INTERVALOS DE SEGURANÇA

Intervalos de segurança: Zero dias.

8. PRAZO DE VALIDADE

Exp. {mm/aaaa}
Após a reconstituição, administrar no prazo de 2 horas.

9. PRECAUÇÕES ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO

Armazenar e transportar refrigerado.
Não congelar.
Proteger da luz.

10. MENÇÃO "Antes de administrar, ler o folheto informativo"

Antes de administrar, ler o folheto informativo.

11. MENÇÃO "USO VETERINÁRIO"

USO VETERINÁRIO

Medicamento veterinário sujeito a receita médico-veterinária.

12. MENÇÃO "MANTER FORA DA VISTA E DO ALCANCE DAS CRIANÇAS"

Manter fora da vista e do alcance das crianças.

13. NOME DO TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO

Zoetis Portugal, Lda.

14. NÚMEROS DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO

AIM n.º 819/09RIVPT

15. NÚMERO DO LOTE

Lot {número}

INDICAÇÕES A INCLUIR NO ACONDICIONAMENTO SECUNDÁRIO

CAIXA DE PLÁSTICO (1 DOSE)

1. NOME DO MEDICAMENTO VETERINÁRIO

Rispoval RS+PI3 IntraNasal spray nasal, liofilizado e solvente para suspensão

2. DESCRIÇÃO DAS SUBSTÂNCIAS ATIVAS

Cada dose de 2 ml contém:

Vírus da parainfluenza bovina tipo 3 (PI3V), estirpe RLB 103, vivo $10^{5.0}$ - $10^{8.6}$ $DICC_{50}$.
Vírus respiratório sincicial bovino (BRSV), estirpe 375, vivo $10^{5.0}$ - $10^{7.2}$ $DICC_{50}$.

3. DIMENSÃO DA EMBALAGEM

5 x 1 dose

4. ESPÉCIES-ALVO

Bovinos.

5. INDICAÇÕES

6. VIAS DE ADMINISTRAÇÃO

Administração nasal.

7. INTERVALOS DE SEGURANÇA

Intervalos de segurança: Zero dias.

8. PRAZO DE VALIDADE

Exp. {mm/aaaa}
Após a reconstituição, administrar no prazo de 2 horas.

9. PRECAUÇÕES ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO

Armazenar e transportar refrigerado.
Não congelar.
Proteger da luz.

10. MENÇÃO "Antes de administrar, ler o folheto informativo"

Antes de administrar, ler o folheto informativo.

11. MENÇÃO "USO VETERINÁRIO"

USO VETERINÁRIO

Medicamento veterinário sujeito a receita médico-veterinária.

12. MENÇÃO "MANTER FORA DA VISTA E DO ALCANCE DAS CRIANÇAS"

Manter fora da vista e do alcance das crianças.

13. NOME DO TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO

Zoetis Portugal, Lda.

14. NÚMEROS DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO

AIM n.º 819/09RIVPT

15. NÚMERO DO LOTE

Lot {número}

INDICAÇÕES A INCLUIR NO ACONDICIONAMENTO PRIMÁRIO

RÓTULO NO FRASCO DE VIDRO – LIOFILIZADO (5 OU 25 DOSES)

1. NOME DO MEDICAMENTO VETERINÁRIO

Rispoval RS+PI3 IntraNasal spray nasal, liofilizado e solvente para suspensão

2. DESCRIÇÃO DAS SUBSTÂNCIAS ATIVAS

PI3V, estirpe RLB 103, vivo $10^{5.0}$ - $10^{8.6}$ $DICC_{50}$.
BRSV, estirpe 375, vivo $10^{5.0}$ - $10^{7.2}$ $DICC_{50}$.

5 doses
25 doses

3. ESPÉCIES-ALVO

Bovinos.

4. VIAS DE ADMINISTRAÇÃO

Administração nasal.
Antes de administrar, ler o folheto informativo.

5. INTERVALOS DE SEGURANÇA

Intervalos de segurança: Zero dias.

6. PRAZO DE VALIDADE

Exp. {mm/aaaa}
Após a reconstituição, administrar no prazo de 2 horas.

7. PRECAUÇÕES ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO

Armazenar e transportar refrigerado.
Não congelar.
Proteger da luz.

8. NOME DO TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO

Zoetis Portugal, Lda.

9. NÚMERO DO LOTE

Lot {número}

INDICAÇÕES MÍNIMAS A INCLUIR EM PEQUENAS UNIDADES DE ACONDICIONAMENTO PRIMÁRIO

RÓTULO NO FRASCO DE VIDRO – LIOFILIZADO (1 DOSE)

1. NOME DO MEDICAMENTO VETERINÁRIO

Rispoval RS+PI3 IntraNasal

2. INFORMAÇÕES QUANTITATIVAS SOBRE AS SUBSTÂNCIAS ATIVAS

BRSV e PI3V bovino, vivos

1 dose

3. NÚMERO DO LOTE

Lot {número}

4. PRAZO DE VALIDADE

Exp. {mm/aaaa}
Após a reconstituição, administrar no prazo de 2 horas.

INDICAÇÕES MÍNIMAS A INCLUIR EM PEQUENAS UNIDADES DE ACONDICIONAMENTO PRIMÁRIO

RÓTULO NO FRASCO DE VIDRO – SOLVENTE (2, 10 OU 50 ML)

1. NOME DO MEDICAMENTO VETERINÁRIO

Rispoval RS+PI3 IntraNasal
Solvente

2. INFORMAÇÕES QUANTITATIVAS SOBRE AS SUBSTÂNCIAS ATIVAS

1 dose (2 ml)
5 doses (10 ml)
25 doses (50 ml)

3. NÚMERO DO LOTE

Lot {número}

4. PRAZO DE VALIDADE

Exp. {mm/aaaa}
Após a reconstituição, administrar no prazo de 2 horas.

B. FOLHETO INFORMATIVO

FOLHETO INFORMATIVO

1. Nome do medicamento veterinário

Rispoval RS+PI3 IntraNasal spray nasal, liofilizado e solvente para suspensão para bovinos

2. Composição

Cada dose de 2 ml contém:

Substâncias ativas:

Liofilizado
Vírus da parainfluenza bovina tipo 3 (PI3V), estirpe RLB 103, vivo $10^{5.0}$ - $10^{8.6}$ $DICC_{50}$.
Vírus respiratório sincicial bovino (BRSV), estirpe 375, vivo $10^{5.0}$ - $10^{7.2}$ $DICC_{50}$.

$DICC_{50}$: 50% da dose infecciosa em cultura celular.

Liofilizado: pastilha liofilizada de coloração ligeiramente esbranquiçada a amarelada.
Solvente: líquido límpido e incolor, isento de impurezas visíveis.

3. Espécies-alvo

Bovinos.

4. Indicações de utilização

Para vacinação apenas com Rispoval RS+PI3 IntraNasal:
Para a imunização ativa de vitelos, positivos ou negativos a anticorpos de origem materna, a partir dos 9 dias de idade, contra BRSV e PI3V, para reduzir o título médio e a duração da excreção de ambos os vírus.

Início da imunidade: 5 dias para BRSV e 10 dias para PI3V, após uma única administração.
Duração da imunidade: 12 semanas após uma única administração. A duração da imunidade protetora contra a fração PI3V pode ser reduzida em vitelos positivos a anticorpos de origem materna vacinados antes das 3 semanas de idade.

Para primovacinação com Rispoval RS+PI3 IntraNasal seguida de vacinação de reforço com Rispoval 2/BRSV + Pi3*, consultar a informação do medicamento veterinário Rispoval 2/BRSV + Pi3*, para detalhes específicos sobre as indicações.

*Onde este medicamento veterinário estiver autorizado.

5. Contraindicações

Não existentes.

6. Advertências especiais

Advertências especiais:
Vacinar apenas animais saudáveis.

Os animais devem ser vacinados, preferencialmente, pelo menos 10 dias antes de um período de stress ou de elevado risco de infeção, como o reagrupamento ou o transporte dos animais, ou no início da estação de outono. Para obter resultados otimizados, recomenda-se a vacinação de todos os vitelos dentro do mesmo efetivo.

Precauções especiais para uma utilização segura nas espécies-alvo:
Os vírus vacinais podem disseminar-se de vitelos vacinados para vitelos não vacinados e podem provocar uma resposta sorológica, mas sem causar sinais clínicos. Em ensaios laboratoriais, com base em dados envolvendo animais de 3 semanas de idade, observou-se excreção de BRSV e PI3V até 11 e 7 dias, respetivamente, após a administração de uma dose contendo o título máximo de vírus.

Gestação e lactação:
A segurança do medicamento veterinário não foi determinada durante a gestação e lactação. Não administrar durante a gestação e lactação.

Interação com outros medicamentos e outras formas de interação:
Não existe informação disponível sobre a segurança e a eficácia desta vacina quando utilizada com qualquer outro medicamento veterinário. A decisão da administração desta vacina antes ou após a administração de outro medicamento veterinário, deve ser tomada caso a caso.

Sobredosagem:
Em animais privados de colostro e vacinados antes das 3 semanas de idade com uma sobredosagem de 10 vezes, observaram-se aumentos transitórios da temperatura, diarreia nutricional, fezes anómalas e alterações do comportamento.

Restrições especiais de utilização e condições especiais de utilização:
Não aplicável.

Incompatibilidades principais:
Não misturar com qualquer outro medicamento veterinário, exceto com o solvente fornecido para utilização com este medicamento veterinário.

7. Eventos adversos

Bovinos:

Raros (1 a 10 animais / 10 000 animais tratados):
Reação de hipersensibilidade [por exemplo, reação do tipo anafilático (reação alérgica grave)]

A notificação de eventos adversos é importante. Permite a monitorização contínua da segurança de um medicamento veterinário. Caso detete quaisquer efeitos mencionados neste folheto ou outros efeitos mesmo que não mencionados, ou pense que o medicamento veterinário não foi eficaz, informe o seu médico veterinário. Também pode comunicar quaisquer eventos adversos ao Titular da Autorização de

Introdução no Mercado utilizando os detalhes de contacto no final deste folheto, ou através do Sistema Nacional de Farmacovigilância Veterinária (SNFV): farmacovigilancia.vet@dgav.pt

8. Dosagem em função da espécie, via e modo de administração

Dose: 2 ml.

Via: administração nasal.

Programa de vacinação:
Vacinação básica: Deve ser administrada uma dose única de 2 ml de vacina reconstituída, utilizando o aplicador intranasal disponibilizado pela Zoetis, a bovinos a partir dos 9 dias de idade. Recomenda-se mudar de aplicador entre animais para evitar a transmissão de organismos infeciosos.

Para primovacinação com Rispoval RS+PI3 IntraNasal seguida de vacinação de reforço com Rispoval 2/BRSV + Pi3*, consultar a informação do medicamento veterinário Rispoval 2/BRSV + Pi3*, para detalhes específicos sobre o programa de vacinação.

*Onde este medicamento veterinário estiver autorizado.

9. Instruções com vista a uma administração correta

Reconstituição da vacina:

Reconstituir as apresentações de 1 dose e de 5 doses, adicionando asseticamente o solvente ao frasco contendo o liofilizado. Agitar bem antes da administrar.

Reconstituir a apresentação de 25 doses misturando a fração liofilizada com o solvente em 2 etapas:
1. Injetar 10 ml de solvente sobre a pastilha liofilizada, no frasco contendo o liofilizado.
2. Agitar bem e extrair a fração liofilizada reconstituída do frasco, misturando-a com o restante solvente no frasco da fração líquida.

Agitar bem antes de administrar.

Vacina reconstituída: líquido cor-de-rosa a cor de laranja, que pode conter um sedimento solto e ressuspendível.

10. Intervalos de segurança

Zero dias.

11. Precauções especiais de conservação

Manter fora da vista e do alcance das crianças.

Conservar e transportar refrigerado (2 ºC – 8 ºC).
Não congelar.
Proteger da luz.

Não administrar este medicamento veterinário depois de expirado o prazo de validade indicado no rótulo e na embalagem depois de Exp. O prazo de validade corresponde ao último dia do mês indicado.
Prazo de validade após reconstituição de acordo com as instruções: 2 horas.

12. Precauções especiais de eliminação

Os medicamentos não devem ser eliminados no lixo ou nos esgotos domésticos.

Utilize regimes de recolha de medicamentos veterinários para a eliminação de medicamentos veterinários não utilizados ou de resíduos resultantes da utilização desses medicamentos, em cumprimento dos requisitos nacionais e de quaisquer sistemas de recolha nacionais aplicáveis. Estas medidas destinam-se a ajudar a proteger o ambiente.

Pergunte ao seu médico veterinário ou farmacêutico como deve eliminar os medicamentos veterinários que já não são necessários.

13. Classificação dos medicamentos veterinários

Medicamento veterinário sujeito a receita médico-veterinária.

14. Números de autorização de introdução no mercado e tamanhos de embalagem

AIM n.º 819/09RIVPT.

Caixa de cartão com 1 frasco de vidro contendo 5 ou 25 doses de liofilizado, acompanhado de 1 frasco de vidro contendo, respetivamente, 10 ou 50 ml de solvente. Ambos os frascos têm rolha de borracha e cápsula de alumínio.

Caixa de plástico com 5 frascos de vidro de 1 dose de liofilizado, acompanhados de 5 frascos de vidro contendo 2 ml de solvente. Ambos os frascos têm rolha de borracha e cápsula de alumínio.

É possível que não sejam comercializadas todas as apresentações.

15. Data em que o folheto informativo foi revisto pela última vez

10/2026

Está disponível informação pormenorizada sobre este medicamento veterinário na base de dados de medicamentos da União Europeia Union Product Database (https://medicines.health.europa.eu/veterinary).

16. Detalhes de contacto

Titular da Autorização de Introdução no Mercado e detalhes de contacto para comunicar suspeitas de eventos adversos:
Zoetis Portugal, Lda.

Lagoas Park, Edifício 10
2740-271 Porto Salvo
Tel: + 351 210 427 200
zoetis.portugal@zoetis.com

Fabricante responsável pela libertação do lote:
Zoetis Belgium
Rue Laid Burniat 1
1348 Louvain-La-Neuve
Bélgica

17. Outras informações

Para estimular a imunidade ativa contra BRSV e PI3V.